

EFTERAFGRØDER 2023

— Vildt- og blomsterbrakblandinger



TYPER OG SORTIMENT

– for efterafgrøder, vildt-, biodiversitets- og blomsterbrakblandinger

Typer af efterafgrøder

I efteråret 2023 forventes tre typer af efterafgrøder: pligtige efterafgrøder, husdyrefterafgrøder og målrettede efterafgrøder. For kvægundtagelsesbrug er der desuden krav om, at mindst 80% af harmoniarealet skal dyrkes med roer, græs, rodchikorie, græs- eller cikorieudlæg eller græsefterafgrøder. Bemærk at græsefterafgrøder anmeldt som målrettede efterafgrøder ikke kan indgå i opfyldelse af 80%-kravet på kvægundtagelsesbrugene. De tre typer af efterafgrøder kan alle opfyldes helt eller delvist gennem alternativer til efterafgrøder såsom bl.a. præcisionslandbrug, reduceret N-kvote, mellemafgrøder, tidlig såning af vintersæd samt anvendelse af færdigblandinger med et dokumenterbart indhold ved indkøb på højst 25% N-fikserende arter (beregnet ud fra frøantal).

Der skal ikke etableres MFO-efterafgrøder fra og med efteråret 2023, og der er således ikke længere lovkrav om anvendelse af efterafgrødeblandinger bestående af mindst to arter (da det var udløst af MFO-efterafgrødekravet). De tre typer af efterafgrøder i efteråret 2023 kan alle opfyldes gennem anvendelse af én af nedenstående godkendte arter (det er dog fortsat tilladt, at der indgår flere godkendte arter i blandingen):

GODKENDTE ARTER TIL EFTERAFGRØDER AFHÆNGIG AF ETABLERINGSTIDSPUNKT	
ETABLERET I FORÅRET OG SENEST 1. AUGUST*	ETABLERET SENEST 20. AUGUST (7. SEPTEMBER)*
Korsblomstrede afgrøder	Korsblomstrede afgrøder
Korn	Klinte
Rent græs uden kløver	Hjulkrone
Honningurt	Morgenfrue
Cikorie	Honningurt
Klinte	Almindelig rug
Hjulkrone	Stauderug
Morgenfrue	Hybridrug
Frøgræs der efter høst fortsætter som efterafgrøde	Vårbyg
	Havre

*For alternativet "Efterafgrødeblandinger med N-fikserende arter" gælder desuden:

Færdigblandinger med højst 25% N-fikserende arter (beregnet ud fra frøantal), mens resten af blandingen skal bestå af ovennævnte godkendte arter af efterafgrøder, som er afhængig af efterafgrødens såtidspunkt.

Udsæd til efterafgrøder

Jævnfør EU-forordning 2100/94 artikel 14 må der ikke benyttes hybridsorter, herunder hybridrug, som hjemmeavlet udsæd, uanset om det bruges til efterafgrøder eller som hovedafgrøder. Ligeledes må f.eks. honningurt, olieræddike og efterafgrødeblandinger med N-fikserende arter ikke hjemmeavles. Nævnte arter skal være certificerede, og efterafgrødeblandinger med N-fikserende arter skal være færdigblandede med et dokumenterbart indhold fra en forhandler. Endvidere skal egen udsæd af f.eks. vårbyg og havre være dyrket på egen bedrift. Der skal altid betales forædlersafgift af hjemmeavlet udsæd, uanset om det anvendes til efterafgrøder eller som hovedafgrøder.



TYPER OG SORTIMENT

– for efterafgrøder, vildt-, biodiversitets- og blomsterbrakblandinger

4%-udtagning samt prioritering af øget biodiversitet

I landbrugsreformen gældende for 2023-2027 skal der udlægges mindst 4% af omdriftsarealet med "ikke-produktive" arealer i form af brak, blomster- og/eller bestøverbrak, markbræmmer, småbiotoper, markkrat, GLM-søer og/eller GLM-fortidsminder.

Den nye landbrugsreform åbner samtidig op for tilskud til forskellige bioordninger; herunder bl.a. ordningen om biodiversitet og bæredygtighed, hvis formål er at forbedre biodiversiteten på bedriften ved at give tilskud til "ikke-produktive" arealer, som udlægges ud over 4% udtagningskravet.

Der er ikke krav til typen af plantedække på "ikke-produktive" arealer, som anmeldes som slåningsbrak, men etablering af et tæt græs- og/eller kløvergræs-plantedække på arealerne vil reducere ukrudtsproblemer. Uanset hvad skal der være et plantedække på hele arealet. Anmeldes "ikke-produktive" arealer som blomsterbrak er der krav til, at der er mindst to frø- og nektarproducerende arter pr. m². Denne sammensætning er opfyldt i blandingen BLOMSTERBRAK – BIVEJEN, 2-årig, som i øvrigt også kan anvendes som bestøverbrak.

Et forsat vigtigt element i en øget biodiversitet er etablering af vildtagre og -striber. ALLROUND VILDTBLANDING kan anvendes til dette formål, når gældende regler for etablering overholdes.

I nedenstående oversigt ses Nordic Seeds sortiment af efterafgrøder, blandinger til blomsterbrak og vildt- og biodiversitet. Desuden forhandles DLF's sortiment.

ARTER, SORTER OG BLANDINGER TIL ALLE TYPER EFTERAFGRØDER					
	NEMATODE- RESISTENS	KAN INDGÅ I SÆDSKIFTER*	TKV	COATED	KG/HA
RENT GRÆS					
ALM. SILDIG RAJGRÆS, PLÆNETYPE TIL UDLÆG I KORN	-	Alle pånær frøgræs	3,0-4,0	-	8-10
ALM. SILDIG RAJGRÆS, FODERTYPE TIL UDLÆG I MAJS	-	Alle pånær frøgræs	3,0-4,0	-	8-10
KLØVERGRÆS (TIL BRUG FOR ALTERNATIVET: EFTERAFGRØDEBLANDING MED N-FIKSERENDE ARTER)**					
BLANDING 220	-	Alle pånær frøgræs	-	-	10-15
OLIERÆDDIKE					
SILENTINA/RUTINA, STANDARD	-	Korn, frø, raps	12-15	-	10-15
SILENTINA/RUTINA, COATED	-	Korn, frø, raps	22-25	Olieræddike	10-15
GUILLOTINE	x	Korn, frø, raps, roer	12-15	-	10-15***
ATLANTIS/DEFENDER	xx	Korn, frø, raps, roer og kartofler	12-15	-	10-15***
BLANDING TIL EFTERAFGRØDER					
BLÅGUL (OLIERÆDDIKE + HONNINGURT)	-	Alle; ingen nematode-resistens	-	Honningurt	10-15
BLANDING TIL BLOMSTERBRAK					
BIVEJEN, 2-ÅRIG					8-12
BLANDING TIL VILDTPLEJE					
ALLROUND VILDTBLANDING					40-60

*Hold mindst 5 frie år mellem raps i sædskiftet.

**Kløvergræs blanding 220 kan anvendes til opfyldelse af efterafgrødekravet, hvis det er tilmeldt alternativet "Efterafgrødeblanding med N-fikserende arter".

***Udsædsmængder op mod 25 kg/ha vil øge reduktionen af nematoder.

EFTERAFGRØDE GRÆS TIL ISÅNING I KORN

ALM. SILDIG RAJGRÆS, PLÆNETYPE



EGENSKABER

- Langsom svag vækst indtil høst af hovedafgrøden
- Dækkende vækst efter høst af kornafgrøder
- Høj vinterfasthed
- Kan opfylde alle efterafgrødetyper

VÆKSTMØNSTER VED UNDERSÅNING

Langsom Hurtig

DÆKNINGSGRAD TIDLIGT EFTERÅR

Moderat Kraftig

RODDYBDE

Øverlig Dyb

VINTERFASTHED

Lav Høj

Alm. rajgræs har et højt C/N-forhold, som giver en langsom frigivelse af kvælstof til den efterfølgende afgrøde i foråret. Den udvintres ikke, og er derfor velegnet på især sandjord for at reducere kvælstofudvaskning i løbet af vinteren og det meget tidlige forår.

På sandjord samt på lerjord i den vestlige del af landet bør græsefterafgrøder først destrueres i det tidlige forår. På lerjord i de østlige egne af landet og/eller ved pløjefri dyrkning er det en fordel at destruere græsefterafgrøder fra medio november eller så tidligt som muligt i foråret.

OBS:

Tjek altid gældende lovgivning for destruktion/nedvisning af efterafgrøder.

Pakningsstørrelse: 10 kg.

FAKTA

	NEMATODE-RESISTENS	ALLE TYPER EFTERAFGRØDER	KAN INDGÅ I SÆDSKIFTER	TKV	KG/HA
Alm. sildig rajgræs, plænetype	-	x	Alle, undtagen frøgræs	3-4	8-10

EFTERAFGRØDE GRÆS TIL ISÅNING I MAJS

ALM. SILDIG RAJGRÆS, FODERTYPE



EGENSKABER

- Høj vinterfasthed
- Kan opfylde alle efterafgrødetyper

VÆKSTMØNSTER VED UNDERSÅNING

Langsom				Hurtig
---------	--	--	--	--------

DÆKNINGSGRAD TIDLIGT EFTERÅR

Moderat				Kraftig
---------	--	--	--	---------

RODDYBDE

Øverlig				Dyb
---------	--	--	--	-----

VINTERFASTHED

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

Alm. rajgræs har et højt C/N-forhold, som giver en langsom frigivelse af kvælstof til den efterfølgende afgrøde i foråret. Den udvintres ikke, og er derfor velegnet på især sandjord for at reducere kvælstofudvaskning i løbet af vinteren og det meget tidlige forår.

Alle typer græsefterafgrøder i majs må tidligst nedpløjes, nedvisnes eller destrueres efter 1. marts, herunder græsefterafgrøder til evt. opfyldelse af 80%-reglen på kvægundtagelsesbrug.

OBS:

Tjek altid gældende lovgivning for destruktion/nedvisning af efterafgrøder.

Pakningsstørrelse: 10 kg.

FAKTA

	NEMATODE-RESISTENS	ALLE TYPER EFTERAFGRØDER	KAN INDGÅ I SÆDSKIFTER*	TKV	KG/HA
Alm. sildig rajgræs, fodertype	–	x	Alle, undtagen frøgræs	3-4	8-10*

*) I majs etableres græsset samtidig med en radrensning på majsens 6-8 bladstadiet.

EFTERAFGRØDE KLØVERGRÆS TIL ISÅNING I KORN

BLANDING 220 (TIL ALTERNATIVET "EFTERAFGRØDEBLANDINGER MED N-FIKSERENDE ARTER")



EGENSKABER

- Langsom svag vækst indtil høst af hovedafgrøden
- Dækkende vækst efter høst af kornafgrøder
- Høj vinterfasthed
- Skal etableres i foråret som undersåning i dæksæd af vårkorn
- Kan opfylde alle efterafgrødetyper gennem tilmelding til alternativet: Efterafgrødeblandinger med N-fikserede arter

VÆKSTMØNSTER VED UNDERSÅNING

Langsom Hurtig

DÆKNINGSGRAD TIDLIGT EFTERÅR

Moderat Kraftig

RODDYBDE

Øverlig Dyb

VINTERFASTHED

Lav Høj

Kløvergræs-efterafgrøder anmeldt som alternativet "Efterafgrødeblandinger med N-fikserede arter" skal være etableret senest 1. august, og må tidligst nedpløjes, nedvises eller på anden vis destrueres efter 1. februar det efterfølgende år. Kløvergræs-efterafgrøder skal efterfølges af vårsæd. Landsforsøg 2022 med kløvergræs som efterafgrøde har vist eftervirkninger på 30-40 kg/ha N ved god etablering med øverlig sådybde (maks. 2 cm) og anvendelse af ukrudtsmidler, som kløvergræsset kan tåle.

Efterafgrødeblandinger med N-fikserede arter har en lovgivningsmæssig eftervirkning på 50 kg/ha N, som fratrækkes bedriftens N-kvotet i det efterfølgende år.

Ved en kontrol skal man kunne dokumentere, at den udsåede blanding indeholder højst 25% N-fikserede arter, og der skal kunne fremvises en faktura for den købte færdigblanding, som udover N-fikserende arter kun må indeholde andre godkendte efterafgrødearter.

OBS:

Tjek altid gældende lovgivning for destruktion/nedvisning af efterafgrøder.

Pakningsstørrelse: 10 kg.

FAKTA

	NEMATODE-RESISTENS	SOM ALTERNATIV TIL ALLE TYPER EFTERAFGRØDER	KAN INDGÅ I SÆDSKIFTER	TKV	KG/HA
Blanding 22	-	x	Alle, undtagen frøgræs	-	10-15

SILETINA/RUTINA

OLIERÆDDIKE, STANDARD



EGENSKABER

- Hurtig og dækkende vækst ved god etablering inden ca. 20. august
- Stor bladmasse
- Dyb rodvækst
- Høj kvælstofoptagelse
- Kan opfylde alle efterafgrødetyper

VÆKSTMØNSTER

Langsom				Hurtig
---------	--	--	--	--------

DÆKNINGSGRAD VED RETTIDIG ETABLERING

Moderat				Kraftig
---------	--	--	--	---------

BLOMSTRING

Tidlig				Sen
--------	--	--	--	-----

RODDYBDE

Øverlig				Dyb
---------	--	--	--	-----

REDUKTIONSEFFEKT, NEMATODER

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

ETABLERINGSTIDSPUNKT

Juli				August
------	--	--	--	--------

Olieræddike har et lavt C/N-forhold, som giver en hurtigt frigivelse af kvælstof til den efterfølgende afgrøde i foråret. Den udvintrer normalt hen over vinteren og er velegnet på især lerede jordtyper.

I modsætning til andre korsblomstrende arter opformerer olieræddike kun kålbrot i meget begrænset omfang. Da olieræddike er en meget effektiv efterafgrøde anbefales at tage de angivne dyrkningstiltag i tabellen nedenfor i brug, så olieræddike fortsat kan indgå som efterafgrøde i rapssædsifter.

OBS:

Tjek altid gældende lovgivning for destruktion/nedvisning af efterafgrøder.

Pakningsstørrelse: 10 kg.

FAKTA

	NEMATODERESISTENS	ALLE TYPER EFTERAFGRØDER	KAN INDGÅ I SÆDSKIFTER*	TKV	KG/HA
Siletina/Rutina	-	x	Korn, frø, raps	12-15	10-15

*) Hold mindst 5 frie år mellem raps i sædskeft.

OVERSIGT OVER DYRKNINGSFAKTORER, DER FREMMER KÅLBROK

DYRKNINGSFAKTORER DER FREMMER KÅLBROK	BETYDNING*
Sædskefte med hyppig raps	xxxxx
Sennep som hyppig efterafgrøde	xxxx
Rapsspildplanter efter høst	xx
Korsblomstret ukrudt	xx
Fugtige pletter i marken	xx
Lave reaktionstal	xx
Meget tidlig såning	xx
Hyppig dyrkning af kålbrotresistente rapssorter	xx til xxxxx
Olieræddike som efterafgrøde	x til ?
Manglende rengøring af maskiner/redskaber for jord	Bringer smitte ind i marken

*Antallet af X'er indikerer risikoen. Jo flere X'er, jo større risiko.

Kilde: Landbrugsinfo, SEGES

SILETINA/RUTINA

OLIERÆDDIKE, COATED



EGENSKABER

- Meget velegnet til opfyldelse af alternativet "Mellemafgrøder" pga. coating og bedre spredbarhed
- Hurtig og dækkende vækst ved god etablering inden ca. 20. august
- Stor bladmasse
- Dyb rodvækst
- Høj kvælstofoptagelse
- Kan opfylde alle efterafgrødetyper

VÆKSTMØNSTER

Langsom				Hurtig
---------	--	--	--	--------

DÆKNINGSGRAD VED RETTIDIG ETABLERING

Moderat				Kraftig
---------	--	--	--	---------

BLOMSTRING

Tidlig				Sen
--------	--	--	--	-----

RODDYBDE

Øverlig				Dyb
---------	--	--	--	-----

REDUKTIONSEFFEKT, NEMATODER

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

ETABLERINGSTIDSPUNKT

Juli				August
------	--	--	--	--------

Olieræddike har et lavt C/N-forhold, som giver en hurtigt frigivelse af kvælstof til den efterfølgende afgrøde i foråret. Den udvintrer normalt hen over vinteren og er velegnet på især lerede jordtyper.

I modsætning til andre korsblomstrende arter opformerer oileræddike kun kålbrot i meget begrænset omfang. Da oileræddike er en meget effektiv efterafgrøde anbefales at tage de angivne dyrkningstiltag i tabellen nedenfor i brug, så oileræddike fortsat kan indgå som efterafgrøde i rapssædskifter.

OBS:

Tjek altid gældende lovgivning for destruktion/nedvisning af efterafgrøder.

Pakningsstørrelse: 10 kg.

FAKTA

	NEMATODERESISTENS	ALLE TYPER EFTERAFGRØDER	KAN INDGÅ I SÆDSKIFTER*	TKV	KG/HA
Siletina/Rutina	-	x	Korn, frø, raps	22-25	10-15

*) Hold mindst 5 frie år mellem raps i sædskiftet.


OVERSICHT OVER DYRKNINGSFAKTORER, DER FREMMER KÅLBROK

DYRKNINGSFAKTORER DER FREMMER KÅLBROK	BETYDNING*
Sædskifte med hyppig raps	xxxxx
Sennep som hyppig efterafgrøde	xxxx
Rapsspildplanter efter høst	xx
Korsblomstret ukrudt	xx
Fugtige pletter i marken	xx
Lave reaktionstal	xx
Meget tidlig såning	xx
Hyppig dyrkning af kålbrotresistente rapssorter	xx til xxxxx
Olieræddike som efterafgrøde	x til ?
Manglende rengøring af maskiner/redskaber for jord	Bringer smitte ind i marken

*Antallet af X'er indikerer risikoen. Jo flere X'er, jo større risiko.
Kilde: Landbrugsinfo, SEGES

ATLANTIS/DEFENDER TIL ROE- OG KARTOFFELSÆDSKIFTER

OLIERÆDDIKE, DOBBELT NEMATODERESISTENT



EGENSKABER

- Høj reduktionseffekt overfor både roecystenematoder, rodgalle-nematoder, rodlæssionsnematoder og fritlevende nematoder
- Hurtig og dækkende vækst ved god etablering inden ca. 20. august
- Dyb rodvækst og høj kvælstofoptagelse
- Velegnet i kartoffelsædskifter
- Kan opfylde alle efterafgrødetyper

VÆKSTMØNSTER

Langsom				Hurtig
---------	--	--	--	--------

DÆKNINGSGRAD VED RETTIDIG ETABLERING

Moderat				Kraftig
---------	--	--	--	---------

BLOMSTRING

Tidlig				Sen
--------	--	--	--	-----

RODDYBDE

Øverlig				Dyb
---------	--	--	--	-----

REDUKTIONSEFFEKT, FLERE NEMATODER

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

ETABLERINGSTIDSPUNKT

Juli				August
------	--	--	--	--------

Olieræddike har et lavt C/N-forhold, som giver en hurtigt frigivelse af kvælstof til den efterfølgende afgrøde i foråret. Den udvintrer normalt hen over vinteren og er velegnet på især lerede jordtyper.

I modsætning til andre korsblomstrende arter opformerer olieræddike kun kålbrot i meget begrænset omfang. Da olieræddike er en meget effektiv efterafgrøde anbefales at tage de angivne dyrkningstiltag i tabellen nedenfor i brug, så olieræddike fortsat kan indgå som efterafgrøde i rapssædskifter.

OBS:

Tjek altid gældende lovgivning for destruktion/nedvisning af efterafgrøder.

Pakningsstørrelse: 10 kg.

FAKTA

	NEMATODERESISTENS (DOBBELT NEMATODERESISTENS)	ALLE TYPER EFTERAFGRØDER	KAN INDGÅ I SÆDSKIFTER*	TKV	KG/HA
Atlantis	xx	x	Alle, inkl. roer og kartofler	12-15	10-15**

*) Hold mindst 5 frie år mellem raps i sædskiftet.

**) Udsædsmængder op mod 25 kg/ha vil øge reduktionen af nematoder.

OVERSIGT OVER DYRKNINGSFAKTORER, DER FREMMER KÅLBROK

DYRKNINGSFAKTORER DER FREMMER KÅLBROK	BETYDNING*
Sædskifte med hyppig raps	xxxxx
Gul sennep som hyppig efterafgrøde	xxxx
Rapspildplanter efter høst	xx
Korsblomstret ukrudt	xx
Fugtige pletter i marken	xx
Lave reaktionstal	xx
Meget tidlig såning	xx
Hyppig dyrkning af kålbrotresistente rapssorter	xx til xxxxx
Olieræddike som efterafgrøde	x til ?
Manglende rengøring af maskiner/redskaber for jord	Bringer smitte ind i marken

*Antallet af X'er indikerer risikoen. Jo flere X'er, jo større risiko.

Kilde: Landbrugsinfo, SEGES

GUILLotine TIL ROESÆDSKIFTER

OLIERÆDDIKE, NEMATODERESISTENT



EGENSKABER

- Høj reduktion af roecystenematoder
- Hurtig og dækkende vækst ved god etablering inden ca. 20. august
- Stor bladmasse
- Dyb rodvækst og høj kvælstofoptagelse
- Velegnet i roesædskeer
- Kan opfylde alle efterafgrødetyper

VÆKSTMØNSTER

Langsom				Hurtig
---------	--	--	--	--------

DÆKNINGSGRAD VED RETTIDIG ETABLERING

Moderat				Kraftig
---------	--	--	--	---------

BLOMSTRING

Tidlig				Sen
--------	--	--	--	-----

RODDYBDE

Øverlig				Dyb
---------	--	--	--	-----

REDUKTIONSEFFEKT, ROECYSTENEMATODER

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

ETABLERINGSTIDSPUNKT

Juli				August
------	--	--	--	--------

Olieræddike har et lavt C/N-forhold, som giver en hurtigt frigivelse af kvælstof til den efterfølgende afgrøde i foråret. Den udvintrer normalt hen over vinteren og er velegnet på især lerede jordtyper.

I modsætning til andre korsblomstrende arter opformerer olieræddike kun kålbrot i meget begrænset omfang. Da olieræddike er en meget effektiv efterafgrøde anbefales at tage de angivne dyrkningsstiltag i tabellen nedenfor i brug, så olieræddike fortsat kan indgå som efterafgrøde i rapssædskeer.

OBS:

Tjek altid gældende lovgivning for destruktion/nedvisning af efterafgrøder.

Pakningsstørrelse: 10 kg.

FAKTA

	NEMATODERESISTENS (ROECYSTENEMATODER)	ALLE TYPER EFTERAFGRØDER	KAN INDGÅ I SÆDSKIFTER*	TKV	KG/HA
Guillotine	x	x	Korn, frø, raps, roer	12-15	10-15**

*) Hold mindst 5 frie år mellem raps i sædskeft.

**) Udsædsmængder op mod 25 kg/ha vil øge reduktionen af nematoder.

OVERSIGT OVER DYRKNINGSFAKTORER, DER FREMMER KÅLBROK

DYRKNINGSFAKTORER DER FREMMER KÅLBROK	BETYDNING*
Sædskefte med hyppig raps	xxxxx
Sennep som hyppig efterafgrøde	xxxx
Rapsspildplanter efter høst	xx
Korsblomstret ukrudt	xx
Fugtige pletter i marken	xx
Lave reaktionstal	xx
Meget tidlig såning	xx
Hyppig dyrkning af kålbrotresistente rapssorter	xx til xxxxx
Olieræddike som efterafgrøde	x til ?
Manglende rengøring af maskiner/redskaber for jord	Bringer smitte ind i marken

*Antallet af X'er indikerer risikoen. Jo flere X'er, jo større risiko.

Kilde: Landbrugsinfo, SEGES

BLÅGUL BLANDING

OLIERÆDDIKE OG COATED HONNINGURT



EGENSKABER

- Hurtig og god dækkende vækst ved god etablering inden ca. 20. august
- Dyb rodvækst
- Frøene af honningurt er coatede for bedre spredbarhed
- Kan opfylde alle efterafgrødetyper

VÆKSTMØNSTER

Langsom					Hurtig
---------	--	--	--	--	--------

DÆKNINGSGRAD VED RETTIDIG ETABLERING

Moderat					Kraftig
---------	--	--	--	--	---------

BLOMSTRING

Tidlig					Sen
--------	--	--	--	--	-----

RODDYBDE

Overlig					Dyb
---------	--	--	--	--	-----

REDUKTIONSEFFEKT, NEMATODER

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

ETABLERINGSTIDSPUNKT

Juli					August
------	--	--	--	--	--------

Olieræddike og honningurt har et lavt C/N-forhold, som giver en hurtig frigivelse af kvælstof til den efterfølgende afgrøde i foråret. Den udvintrer normalt hen over vinteren og er velegnet på alle jordtyper.

I modsætning til andre korsblomstrende arter opformerer olieræddike kun kålbrot i meget begrænset omfang. Da olieræddike er en meget effektiv efterafgrøde anbefales at tage de angivne dyrkningstiltag i tabellen nedenfor i brug, så olieræddike fortsat kan indgå som efterafgrøde i rapssædskifter.

OBS:

Tjek altid gældende lovgivning for destruktion/nedvisning af efterafgrøder.

Pakningsstørrelse: 10 kg.

FAKTA

	NEMATODE-RESISTENS	ALLE TYPER EFTERAFGRØDER	KAN INDGÅ I SÆDSKIFTER	TKV	KG/HA	HONNINGURT COATED
Blågul	-	x	Alle, dog ingen nematoderesistens	-	10-15	x

OVERSICHT OVER DYRKNINGSFAKTORER, DER FREMMER KÅLBROK

DYRKNINGSFAKTORER DER FREMMER KÅLBROK	BETYDNING*
Sædskifte med hyppig raps	xxxxx
Gul sennep som hyppig efterafgrøde	xxxx
Rapsspildplanter efter høst	xx
Korsblomstret ukrudt	xx
Fugtige pletter i marken	xx
Lave reaktionstal	xx
Meget tidlig såning	xx
Hyppig dyrkning af kålbrotresistente rapssorter	xx til xxxxx
Olieræddike som efterafgrøde	x til ?
Manglende rengøring af maskiner/redskaber for jord	Bringer smitte ind i marken

*Antallet af X'er indikerer risikoen. Jo flere X'er, jo større risiko.
Kilde: Landbrugsinfo, SEGES

BLOMSTERBRAK

BI-VEJEN, 2-ÅRIG

EGENSKABER

BI-VEJEN kan anvendes som blomsterbrak til opfyldelse af bl.a. 4% udtagningskravet. Blandingen kan også anvendes som bestøverbrak.

BI-VEJEN er sammensat af arter, der blomstrer henover en lang periode, således at bier og insekter vil få glæde og gavn af den både sommer og efterår.

Der er tilstræbt en mængdemæssig balance mellem af de forskellige arter både i forhold til frøstørrelse, vækstrytme og levedygtighed. Som tillæg vil fugle og dyr få gavn af planternes frø efter afblomstring.

Når du vælger BI-VEJEN (2-årig) vil du få en flot bestand af arter, der blomstrer i farverne rød, gul, hvid, lilla og blå. Bunddækket består af hvidkløver, alsikekløver (giftig for heste) og rødkløver, mens lucerne, hør, honningurt, kællingetand, solsikke og boghvede løfter blandingen. Blomstringen starter således primo juni og varer indtil september.

ETABLERING

Anmeldes BI-VEJEN som blomsterbrak skal den udsås inden 30. april.

Gentagne harvninger vil ofte reducere ukrudtsmængden. Sørg for at jorden er så ren som mulig forud for såning. En vellykket pløjning er ofte det bedste grundlag. Så ikke for tidligt i en kold og meget fugtig jord. Ved bekvemt såbed spirer BI-VEJEN hurtigere frem og vil have en betydelig bedre konkurrenceevne. Så ikke for dybt. Mange af arterne kan dårligt spire frem, hvis de sås dybere end 1 cm.

Udsædsmængde 1,0 kg/1.000 m² svarende til 10 kg/ha.

Et godt håndværk ved såbedstilberedning og såning giver det bedste grundlag for succes med BI-VEJEN.

SAMMENSÆTNING BI-VEJEN (2-ÅRIG)

ART	% FRØVÆGT
Lucerne	9
Boghvede	18
Alsikekløver	9
Honningurt	13
Hør	18
Rødkløver	9
Hvidkløver	9
Kællingetand	5
Solsikke	10

Vælges BI-VEJEN (2-årig) kan der gøres brug af muligheden for 2-årigt aktivitetskrav på anmeldte blomsterbrakarealer.

OBS:

Tjek altid gældende lovgivning på www.landbrugsstyrelsen.dk

Pakningsstørrelse: 5 kg, 10 kg.



ALLROUND VILDTBLANDING

ANVENDES TIL HJORTE- OG FUGLEVILDT

EGENSKABER

En alsidig sammensat vildtblanding der sikrer gode levevilkår for flest mulige dyr, fra insekter og fugle til råvildt. Ved en god etablering og under optimale forhold kan Allround Vildtblanding holde i 2 år. Ofte vil en afslåning om foråret i andet brugsår være nyttig. Man skal dog ikke ødelægge de redeskjul, som er etableret.

- Såtidspunkt: ultimo april til primo juli
- Udsås i et bekvemt og lunt såbed
- Udsædsmængde 50 kg/ha (1 kg til 200 m²)
- Sådybde: 1 - 2 cm
- 2 års holdbarhed

Allround Vildtblanding kan opnå grundbetaling gennem anmeldelse som bl.a. GB-småbiotop.

OBS:

Tjek altid gældende lovgivning på www.landbrugsstyrelsen.dk

ALLROUND - VILDTBLANDING

ART	% FRØVÆGT
Stauderug	41,4
Vinterraps	4,3
Honningurt	2,9
Boghvede	28,4
Rødkløver	2,9
Gul sennep	4,3
Olieræddike	4,3
Hvidkløver	2,9
Vinterrybs	2,9
Grønkål (Westfalisk)	1,4
Hundegræs	1,4
Bladkål (Polycaul)	1,5





Vejrup Andel

Kontakt en af vore sælgere



Jørn C. Bork

jcb@vejrup-andel.dk
Tlf. 92440054



Henrik H. Kristensen

hhk@vejrup-andel.dk
Tlf. 92920949



Søren Bjerre

sbj@vejrup-andel.dk
Tlf. 23832830



Mogens S. Hansen

msh@vejrup-andel.dk
Tlf. 23442895

God service hver gang!

Vejrup Andels Grovwareforening A.m.b.A

Vejrup Storegade 55, Vejrup
6740 Bramming

Roustvej 241, Roust
6818 Årre

Tlf.: +45 75190054
Fax: +45 75190423
post@vejrup-andel.dk
www.vejrup-andel.dk