

GRÆS 2023

— Stærkt sortiment af kløver- og efterafgrødegræs



AGROWGRASS

AgrowGrass 220

Græsblandingen, AgrowGrass 220 LowMaize, er velegnet i foderrationer, hvor græs udgør hovedparten af grovfoderrationen. Græsblandingens sammensætning er med henblik på et højt udbytte af NDF kombineret med høj fordøjelighed.

AgrowGrass 220 LowMaize er en middeltidlig kløvergræsblanding, hvor hvidkløverandelen udgør 13 %. Kombinationen af di- og tetraploide rajgræsser gør blandingen sædeles velegnet til slæt, men den er også meget velegnet til afgræsning gennem hele sæsonen. Dermed er den også perfekt for den landmand, der vil tage 1. og 2. slæt og efterfølgende afgræsse.

Blandingen kan etableres om foråret eller om efteråret. I foråret anvendes 25 kg/ha, hvis blandingen etableres i dæksæd. Ved etablering i renbestand forår eller efterår anvendes 30 kg/ha. Blandingen kan etableres på alle jordtyper, dog bør det være muligt at vande på de lettere jordtyper.

AgrowGrass 350

AgrowGrass 350 MidiMaize er en middeltidlig kløvergræsblanding, der indeholder en kombination af 3% rød- og 10% hvidkløver. Rødkløver bidrager til et øget udbytte af protein, og hvidkløver bidrager med en øget fordøjelighed af hele blandingen, samtidig med at den giver en god bund i græsmarken.

AgrowGrass 350 MidiMaize indeholder også 20% hybridrajgræs, der med sin kraftige forårvækst er med til at sikre et højt udbytte i 1. slæt.

Fordøjeligheden og kvaliteten i blandingen er høj, og dermed egner blandingen sig i foderrationer, hvor græs udgør 40-60% af grovfoderrationen. Det er vigtigt at tage slæt på det helt rigtige tidspunkt, for at opnå højest mulig fordøjelighed.

AgrowGrass 350 MidiMaize kan dyrkes på alle jordtyper. Blandingen kan etableres om foråret eller om efteråret. I foråret anvendes 25 kg/ha, hvis blandingen etableres i dæksæd. Ved etablering i renbestand forår eller efterår anvendes 30 kg/ha. AgrowGrass 350 MidiMaize kan anvendes både til slæt og afgræsning.



Fokus på kvalitet

Som mælkeproducent er det vigtigt at vælge den rigtige græsblanding, der kan opfylde koens krav og dermed maksimal mælkeproduktion. Vi har i de fire AgrowGrass special-blændinger udvalgt rajgræsser med højt udbytte af NDF kombineret med høj fordøjelighed. Som mælkeproducent er det vigtigt at holde så mange næringsstoffer hjemme på bedriften som muligt. Derfor er det en selvfølge, at vi har udvalgt kløversorter, der kan producere en høj andel protein.

I AgrowGrass konceptet har vi designet 4 specialblændinger, der hver især passer i foderrationer med forskellige andele majs. Vi kalder blandingerne AgrowGrass 220, AgrowGrass 350, AgrowGrass 410 og AgrowGrass 450 - se beskrivelser til venstre.

AgrowGrass 410

Græsblanding, AgrowGrass 410 MidiMaize, er en middeltidlig kløvergræsblanding, der indeholder 11% hvidkløver. Blandingen minder meget om AgrowGrass 350 MidiMaize; dog med den væsentlige forskel, at der ikke er rødkløver i AgrowGrass 410 MidiMaize.

Blandingen indeholder også hybridrajgræs, der bevirker, at blandingen har en hurtig forårvækst. Fordøjeligheden og kvaliteten i blandingen er høj og dermed egner blandingen sig i foderrationer, hvor græs udgør 40-60% af grovfoderrationen. AgrowGrass 410 MidiMaize kan dyrkes på alle jordtyper. Blandingen kan etableres om foråret eller om efteråret.

I foråret anvendes 25 kg/ha, hvis blandingen etableres i dæksæd. Ved etablering i renbestand forår eller efterår anvendes 30 kg/ha. AgrowGrass 410 MidiMaize kan anvendes både til slæt og afgræsning.

AgrowGrass 450

I foderrationer, hvor majs udgør hovedparten af grovfoderrationen, er det vigtigt, at blandingen bidrager med en god strukturværdi og et højt energiniveau. AgrowGrass 450 MaxMaize opfylder disse krav via den store andel af røjsvingel kombineret med 7% rødkløver.

Blandingen indeholder 35% røjsvingel, der har et stort udbyttepotentiale. Røjsvingel har en tidlig forårvækst og hurtig genvækst efter slæt. AgrowGrass 450 MaxMaize er en udpræget slættype, der i mindre grad egner sig til afgræsning. AgrowGrass 450 MaxMaize kan dyrkes på alle jordtyper. Blandingen kan etableres om foråret eller om efteråret.

I foråret anvendes 25 kg/ha, hvis blandingen etableres i dæksæd. Ved etablering i renbestand forår eller efterår anvendes 30 kg/ha.

AgrowGrass Horse afgræsning struktur

AG Horse afgræsning struktur består af sildige rajgræsser med et højt udbyttepotentiale. Derudover indeholder den strandsvingel og røjsvingel der er med til at bidrage til struktur. Der er tilføjet engrapgræs og rødspringel der er med til at sikre en høj slidstyrke ved afgræsning.

AgrowGrass Horse hø og wrap struktur

AG Horse hø og wrap er en græsblanding der er meget velegnet til slæt og hø produktion. Blandingen er middeltidlig og indeholder strandsvingel, røjsvingel og hundegræs der er med til at give struktur.

Oversigt over AgrowGrass blandinger

AGROWGRASS 220	AGROWGRASS 350	AGROWGRASS 410	AGROWGRASS 450
13% Apis, hvidkløver	10% Apis, hvidkløver	11% Apis, hvidkløver	11% Apis, hvidkløver
22% Ecrin, middeltidlig rajgræs, diploid	3% Taifun, rødkløver	20% RGT Everal, hybridrajgræs	
20% Barcampo, middeltidlig rajgræs, tetraploid	20% RGT Everal, hybridrajgræs	26% Ecrin, middeltidlig rajgræs, diploid	7% Titus, rødkløver
20% Barimero, sildig rajgræs, diploid	25% Ecrin, middeltidlig rajgræs, diploid	18% Barcampo, middeltidlig rajgræs, tetraploid	35% Perun, røjsvingel
25% Virtuose, sildig rajgræs, tetraploid	17% Barcampo, middeltidlig rajgræs, tetraploid	25% Barimero, sildig rajgræs, diploid	25% Ecrin, middeltidlig rajgræs, diploid
	25% Barimero, sildig rajgræs, diploid		22% Barcampo, middeltidlig rajgræs, tetraploid

EU KRAV OG GARANTIER FRA DANSKE PRODUCENTER AF GRÆSFRØ

ART	SPIREEVNE (%)			RENHED (%)			UKRUDT (%)		
	EU NORM	DK NORM	NS NORM	EU NORM	DK NORM	NS NORM	EU NORM	DK NORM	NS NORM
Hvidkløver	80	85	85	97	98	98	1,5	0,7	0,7
Rødkløver	80	85	85	97	98	98	1,5	0,7	0,7
Alm. Rajgræs	80	85	85	96	98	98	1,5	0,1	0,1
Timothe	80	85	85	96	98	98	1,5	0,3	0,3
Røjsvingel	75	80	80	96	98	98	1,5	0,3	0,3
Strandsvingel	80	85	85	95	98	98	1,5	0,3	0,3

ALM. RAJGRÆS

Almindelig rajgræs udgør hovedparten i de danske frøblandinger på grund af det høje udbytte og den høje foderværdi.

Almindelig rajgræs har et højt sukkerindhold og en høj fordøjelighed.

Almindelig rajgræs opdeles i to typer: diploide og tetraploide, som igen opdeles i tre tidlighedsgrupper.

- Tidlig
- Middeltidlig
- Sildig

Diploide rajgræsser er finbladede og tætte i væksten, som tåler slid af græs-sende kvæg. Diploide sorter har et højt indhold af tørstof, og en meget god holdbarhed.

Tetraploide rajgræsser har typisk bredere og mørkere blade med et højere sukkerindhold. Tetraploide rajgræsser har mere åben vækst men bedre vin-terfasthed.

I udvælgelsen af sorter til græsblandinge, herunder Agrowgrass blandinger, lægger vi vægt på:

- Højt udbyttepotentiale
- Høj fordøjelighed kombine-ret med højt energi-indhold
- At kombinere sen skridning med god forårsvækst
- At undgå stængler ved genvækst
- Høj persistens

Blanding 22

AgrowGrass 22 er en middeltidlig græsblanding med 15% hvidkløver, fordelt med 11% storbladede og 4% småbladede hvidkløver. Blandingens udemærker sig til afgræsning, men slæt er også en mulighed. Hovedparten af rajgræset er tetraploid, hvilket giver hvid-kløveren gode betingelser for etablering. Blandingens har lav tendens til stængeldannelse idet blandingen indeholder en stor del sildige rajgræsser.

Blanding 24

AgrowGrass 24 er en blanding der har en lang holdbarhed og kan derfor etableres på arealer hvor omlægning kun er muligt hver 4-5 år. Blandingens anvendes primært til afgræsning. Udover alm. rajgræs, så består blandingen af timothe, engsvingel og engrapgræs.

Blanding 26

Agrowgrass 26 er, ligesom blanding 24, velegnet på varige arealer. Dog kan blanding 26 tåle kortvarige oversvømmelse. Blandingens indeholderen bred sammensætning af rajgræs, timothe, rapgræs og engsvingel. En hårdfør blanding til utsatte arealer.

Blanding 33:

Agrowgrass er en ren græsblanding, bestående af middeltidlige og sildige rajgræsser. Blandingens anvendes primært til slæt, men kan også bruges til afgræsning. Blandingens kræver høj tildeling af kvælstof. Blanding 33 kan anvendes som sanerende for kløvertræthed i trængte sædkifter.

Blanding 35

AgrowGrass 35 er sammensat af middeltidlig og sildig diploid, tetraploid rajgræs samt hvidkløver. Blandingens minder om AgrowGrass 33, og forskellen er iblanding af 13% hvidkløver. AgrovGrass 35 egner sig primært til slæt, eller hvor der veksles mellem slæt og afgræs-ning. Med kombinationen af almindelig rajgræs og hvidkløver er det muligt at lave ensilage med meget høj foderværdi.

Blanding 36

AgrovGrass 36 er en varig blanding med 50 % sildig strandsvingel, der primært anvendes til slæt, men kan i mindre grad også anvendes til afgræsning. AgrovGrass 36 er velegnet til lave og fugtige arealer. Den brede sammensætning giver også mulighed for anvendelse på arealer med mere varierende jordtyper. Blandingens forventes at have et relativt lavt energiindhold. AgrovGrass 36 er meget egnet til både slæt og afgræsning

Blanding 45

Agrowgrass 45 er en udpræget slætblanding, bestående af en stor andel rajsringel kombineret med middeltidlig diploid rajgræs. Blan-dingen består desuden af 11% rødkløver og 7% hvidkløver. Rajsringlens oprette vækst giver begrænset bunddække, hvilket kan give util-

sigtet go plads til ukrudt. Blandingens kan etableres på alle jodtyper.

Blanding 60

AgrowGrass 60 er en hesteblanding uden kløver. Der kan tilføres kvælstof hver 4-5. uge i vækstperioden fra april til august. Et græsareal til heste skal også tjene som motionsareal. Blandingens indeholder derfor engrapgræs, der er med til at danne en slidstærk bund. Over-skydende græs kan fortørres og anvendes til hø og ensilage.

Blanding 62

Agrowgrass 62 er en strukturblanding bestående af 50% strandsvingel/rajsringel. Blandingens indeholder ikke rød- og hvidkløver. Blan-dingen er velegnet til hård afgræsning og høproduktion.



AGROWGRASS BLANDINGER 2023

Frøblanding i tabellen er angivet i %.

Leveres i standardpakninger à 10 kg.

Frøblanding 22-62 er sammensat på baggrund af forslag fra Frøblandingsudvalget.

Nordic Seed forbeholder sig ret til at ændre sorter indenfor samme tidlighed og ploidi.



BENYTTELSE	TIL AREALER	JORDBUNDSFORHOLD	TIDLIGHED	AGROWGRASS BLANDINGER	TITUS	DIPLOID	RØDLØVER		STORBLADET	SMÅBLADET	HYDRLØVER	RAJSVINGEL	STRANDSVINGEL	SWAJ	RGT EVERIAL	TETRAPLOID	HYBRIDRAJGRÆS		GENESIS	DILPOID	ALM. RAJGRÆS TIDLIG	BIJOU	TETRAPLOID	ECRIN	DIPLOID	ALM. RAJGRÆS MIDDLETLIG		BARCAMP	TETRAPLOID	KENDAL	ALM. RAJGRÆS SILDIG	VITROSE	TETRAPLOID	SUMMER-GRAZE	TIMOTÉ	LIHEROLD	ENGSVINGEL	RØDSVINGEL	ENGRAPGRÆS	HUNDEGRÆS	UDSÆDSDÆNGDE KG/HA	ESTABLERING MED DÆKSÆD FORAR	ESTABLERING I RENBESTAND FORAR ELLER SENOMMER
							APIS	PERUN																																			
Afgræsning med stor foderoptagelse	I omdrift	Alm. god	Middeltidlig	22		11	4																									20-25	24-30										
				220		13																										20-25	24-30										
Afgræsning på varierende jordtyper	Permanente	Alm./ varierende	Sildig	24		12	8																								20-25	24-30											
		Tør	Middeltidlig	25		12	8																								20-25	24-30											
		Fugtig	Sildig	26		12	8																								20-25	24-30											
Slæt og afgræsning	I omdrift	Alm. god	Middeltidlig	Tidlig	32												45	30	25												20-25	24-30											
				33														15	15	40	15	15									20-25	24-30											
				35		13												15	12	35	15	10									20-25	24-30											
				350	3	10												25		17	25										20-25	24-30											
				Sydvestjylland		10												14	14	22	20										20-25	24-30											
				410		11												20		26	18	25									20-25	24-30											
	Permanente	Alm./tør/fugtig	Sildig	36		14		50																							20-25	24-30											
		Meget fugtig	Middeltidlig	37				20																							20-25	24-30											
Slæt	I omdrift	Alm. god	Middeltidlig	40	9	9		30										15	15												24-28	29-34											
				41		13		30										10	10	20	17										24-28	29-34											
				42	8	9		23										40			20										20-25	24-30											
				Tidlig	43	13		40	22									25		12	25										24-28	29-34											
				45	11	7		45										12	25												24-28	29-34											
				450	7	11		35										25		22											24-28	29-34											
	Alm./tør/fugtig	Middeltidlig/sildig	Middeltidlig/sildig	47	30	5		33										32													24-28	29-34											
				49	11	6		70										15													24-28	29-34											
				50		10		75										15													24-28	29-34											
				Sydvestjylland Struktur	10		35											10	10	15											24-28	29-34											
Heste afgræsning	Permanente	Alm./ varierende	Middeltidlig/sildig	60																											20-25	24-30											
				61			10																								22-27	26-32											
Heste afgr.	Permanente	Alm./ varierende	Middeltidlig/sildig	Ag Horse afgr. struktur			10	20																							27-32	30-35											
Heste struktur og afgræsning	Permanente	Alm./ varierende	Middeltidlig/sildig	62				25	25																						20-25	26-32											
Heste hø og wrap	Permanente	Alm./ varierende	Middeltidlig/sildig	Ag Horse hø & wrap struktur			15	20										15													10	25-30	27-32										



FORAGEMAX BLANDINGER 2023

ForageMax®- og HorseMax®-blandinger. Frøblanding i tabellen er angivet i % af kg. Leveres i standardpakninger à 10 kg.


Frøblanding 21-53 er sammensat på baggrund af forslag fra Frøblandingsudvalget.

De øvrige er specialblandinger fra DLF.

FORAGEMAX® BLANDING	BENYTTELSE	TIL AREALER	JORDBUNDSDRIFTSFORHOLD	TIDLIGHED	FORAGEMAX® BLANDING	MEZZO	LUCERNE	CALLISTO	DIPLOID	RØDKLØVER	AMOS	TETRAPLOID	BRIANNA	EKSTRA STORBLADET	HVIDKLØVER	SILVESTER	STORBLADET	SMÅBLADET	HOSTYN	RAJGRÆSTYPE	FOJTAN	STRANDSVTYPE	HIPAST	SWEETY	STRANDSVINGEL	SILDIG	TOWER	HYBRID-RAJGRÆS	TETRAPLOID	KIMBER	DILPOID	ALM. RAJGRÆS TIDLIG	MATHILDE	TETRAPLOID	MAKURA	DIPLOID	ABOSAN 1	ALM. RAJGRÆS MIDDLETLIG	GARBOR	TETRAPLOID	OVAMBO 1	BOVINI	DIPLOID	ALM. RAJGRÆS SILDIG	SAQUI	HUMBI 1	THEGN	TETRAPLOID	SUMMERGRAZE	TIMOTÉ	WINNETOU	LAURA	ENGSVINGEL	HUNDEGRÆS	DONATA	GONDOLIN	BALIN	SPADONA	CIKORIE	LOTANOVA	KÆLLINGETAND	TONIC	LANCET VEJBRED	VOLHOUDEN	KOMMEN	ANDEL AF BÆLGPLANTER	UDSÆDSMÆNGDE KG/HA
Afgræsning	I omdrift	Alm. god	Middeltidlig	21												15																									29	20-25	24-30																								
Afgræsning	I omdrift	Alm. god	Middeltidlig	22												11	4																							42	20-25	24-30																									
Afgræsning	Permanente	Alm./ varierende	Sildig	24*												12	8																						24	20-25	24-30																										
Afgræsning	Permanente	Tør	Middeltidlig	25*												12	8																						22	20-25	24-30																										
Afgræsning	Permanente	Fugtig	Sildig	26*												12	8																						21	20-25	24-30																										
Afgræsning	I omdrift	Alm. god	Sildig	DLF Biodiversitet Max 25*	4 ²⁾	4										9	10																					24	20-25	24-30																											
Slæt og afgræsning	I omdrift	Alm. god	Middeltidlig	32																																			0	20-25	24-30																										
Slæt og afgræsning	I omdrift	Alm. god	Middeltidlig	33																																			0	20-25	24-30																										
Slæt og afgræsning	I omdrift	Alm. god	Middeltidlig	Tetratop																																			0	22-26	26-31																										
Slæt og afgræsning	I omdrift	Alm. god	Middeltidlig	35												13																						34	20-25	24-30																											
Slæt og afgræsning	I omdrift	Alm. god	Middeltidlig	Sydvestjylland												7	3																					29	20-25	24-30																											
Slæt og afgræsning	Permanente	Alm./tør/fugtig	Sildig	36*												14																						24	20-25	24-30																											
Slæt og afgræsning	Permanente	Meget fugtig	Middeltidlig	37																																			0	20-25	24-30																										
Slæt og afgræsning	Permanente	Alm./tør/fugtig	Middeltidlig	LandboNord Klima												8	7																					28	20-25	24-30																											
Slæt	I omdrift	Alm. god	Middeltidlig	40 Robust Rød												9	9																					35	24-28	29-34																											
Slæt	I omdrift	Alm. god	Middeltidlig	41 Robust Hvid												13																						34	24-28	29-34																											
Slæt	I omdrift	Alm. god	Middeltidlig	Mere Mælk Rød												9	10																				37	20-25	24-30																												
Slæt	I omdrift	Alm. god	Middeltidlig	42												8	9																				32	20-25	24-30																												
Slæt	I omdrift	Alm. god	Tidlig	43												13																					35	20-25	24-30																												
Slæt	I omdrift	Alm. god	Middeltidlig	LandboNord Rød												8	7																				33	24-28	29-34																												
Slæt	I omdrift	Alm. god	Middeltidlig	45												6	5	7																		35	24-28	29-34																													
Slæt	I omdrift	Alm. god	Middeltidlig	LandboNord Hvid												9	5																				39	24-28	29-34																												
Slæt	I omdrift	Alm. god	Middeltidlig	Morsø																																																															

EFTERAFGRØDE GRÆS TIL ISÅNING I KORN

ALM. SILDIG RAJGRÆS, PLÆNETYPE



Alm. rajgræs har et højt C/N-forhold, som giver en langsom frigivelse af kvælstof til den efterfølgende afgrøde i foråret. Den udvintrer ikke, og er derfor velegnet på især sandjord for at reducere kvælstofudvaskning i løbet af vinteren og det meget tidlige forår.

EGENSKABER

- Langsom svag vækst indtil høst af hovedafgrøden
- Dækkende vækst efter høst af kornafgrøder
- Høj vinterfasthed
- Kan opfylde alle efterafgrødetyper

På sandjord samt på lerjord i den vestlige del af landet bør græsefterafgrøder først destrueres i det tidlige forår. På lerjord i de østlige egne af landet og/eller ved pløjefri dyrkning er det en fordel at destruere græsefterafgrøder fra medio november eller så tidligt som muligt i foråret.

OBS:


Tjek altid gældende lovgivning for destruktion/nedvisning af efterafgrøder.

Pakningsstørrelse: 10 kg.

FAKTA					
NEMATODE-RESISTENS	ALLE TYPER EFTERAFGRØDER	KAN INDGÅ I SÆDSKIFTER	TKV	KG/HA	
Alm. sildig rajgræs, plænetype	-	x	Alle, undtagen frøgræs	3-4	8-10

EFTERAFGRØDE GRÆS TIL ISÅNING I MAJS

ALM. SILDIG RAJGRÆS, FODERTYPE



Alm. rajgræs har et højt C/N-forhold, som giver en langsom frigivelse af kvælstof til den efterfølgende afgrøde i foråret. Den udvintrer ikke, og er derfor velegnet på især sandjord for at reducere kvælstofudvaskning i løbet af vinteren og det meget tidlige forår.

EGENSKABER

- Høj vinterfasthed
- Kan opfylde alle efterafgrødetyper

Alle typer græsefterafgrøder i majs må tidligst nedpløjes, nedvisnes eller destrueres efter 1. marts, herunder græsefterafgrøder til evt. opfyldelse af 80%-reglen på kvægundtagelsesbrug.

OBS:

Tjek altid gældende lovgivning for destruktion/nedvisning af efterafgrøder.

Pakningsstørrelse: 10 kg.

FAKTA						
	NEMATODE-RESISTENS	ALLE TYPER EFTERAFGRØDER	KAN INDGÅ I SÆDSKIFTER*	TKV	KG/HA	
Alm. sildig rajgræs, fodertype	-	x	x	Alle, undtagen frøgræs	3-4	8-10*

* I majs etableres græsset samtidig med en radrensning på maajsens 6-8 bladstade.


EFTERAFGRØDE KLØVERGRÆS TIL ISÅNING I KORN

BLANDING 220 (TIL ALTERNATIVET "EFTERAFGRØDEBLANDINGER MED N-FIKSERENDE ARTER")



EGENSKABER

- Langsom svag vækst indtil høst af hovedafgrøden
- Dækende vækst efter høst af kornafgrøder
- Høj vinterfasthed
- Skal etableres i foråret som undersåning i dæksæd af vårkorn
- Kan opfylde alle efterafgrødetyper gennem tilmelding til alternativet: Efterafgrødeblandinger med N-fikserede arter



Kløvergræs-eftersæd anmeldt som alternativet "Efterafgrødeblandinger med N-fikserede arter" skal være etableret senest 1. august, og må tidligst nedpløjes, nedvises eller på anden vis destrueres efter 1. februar det efterfølgende år. Kløvergræs-eftersæd skal efterfølges af vårsæd. Landsforsøg 2022 med kløvergræs som eftersæd har vist eftervirkninger på 30-40 kg/ha N ved god etablering med øverlig sådybde (maks. 2 cm) og anvendelse af ukrudtsmidler, som kløvergræsset kan tåle.

Efterafgrødeblandinger med N-fikserede arter har en lovgivningsmæs-sig eftervirkning på 50 kg/ha N, som fratækkes bedriftens N-kvote i det efterfølgende år.

Ved en kontrol skal man kunne dokumentere, at den udsædede blanding indeholder højst 25% N-fikserede arter, og der skal kunne fremvises en faktura for den købte færdigblanding, som udover N-fikserende arter kun må indeholde andre godkendte efterafgrødearter.

OBS:

Tjek altid gældende lovgivning for destruktion/nedvisning af efterafgrøder.

Pakningsstørrelse: 10 kg.

FAKTA

	NEMATODE-RESISTENS	SOM ALTERNATIV TIL ALLE TYPER EFTERAFGRØDER	KAN INDGÅ I SÆDSKIFTER	TKV	KG/HA
Blanding 22	-	x	Alle, undtagen frøgræs	-	10-15



ENSILERINGSMIDLER

Ensileringsmidlerne må også anvendes af økologer.

Ny bakteriestamme: L. hilgardii CNCM I-4785

For første gang nogenside, er kombinationen af to bakteriestammer godkendt i EU, på baggrund af deres resultater i forsøg.

Med L. hilgardii CNCM I-4785 + L. buchneri NCIMB 40788 giver 1+1=3

100 dages ensilering = 147 timers stabilitet

250 dages ensilering = 365 timers stabilitet

MAGNIVA PLATINUM 1

1 teknologi Heterofermentative bakterier

Til afgrøder med højt sukkerindhold som fx. majs-helsæd og kolbemajs.

Heterofermentative bakterier

Forebygger varmedannelse og tab.

MAGNIVA PLATINUM 2

2 teknologier Heterofermentative bakterier Homofermentative bakterier

Til afgrøder med relativt højt sukkerindhold med moderate ensileringssudfordringer, som som fx. sukkerholdigt græs.

Homofermentative bakterier

Sørger for hurtig ensilering og konserverer derved ensilagen hurtigere.

MAGNIVA PLATINUM 3

3 teknologier Heterofermentative bakterier Homofermentative bakterier Enzymer

Til afgrøder med lavt sukkerindhold, højt proteinindhold og store ensileringssudfordringer, som fx. græs og bælgplanter


Enzymer

Hjælper til med at nedbryde plantefibrer og øger derved fordøjelighed samt frigør opløselige sukre.

ENSILERINGSMIDLER


REDUCER TØRSTOF-TABET MED MAGNIVA

FERMENTERINGSTAB I GRÆSENSILAGE MED 34,5% TØRSTOF



FÅ BEDRE STABILITET MED MAGNIVA

AEROB STABILITET EFTER 100 OG 250 DAGES ENSILING





Vejrup Andel

Kontakt en af vore sælgere



Jørn C. Bork
jcb@vejrup-andel.dk
Tlf. 92440054



Henrik H. Kristensen
hhk@vejrup-andel.dk
Tlf. 92920949



Søren Bjerre
sbj@vejrup-andel.dk
Tlf. 23832830



Mogens S. Hansen
msh@vejrup-andel.dk
Tlf. 23442895

God service hver gang!

Vejrup Andels Grovvareforening A.m.b.A

Vejrup Storegade 55, Vejrup
6740 Bramming

Roustvej 241, Roust
6818 Årre

Tlf.: +45 75190054
Fax: +45 75190423
post@vejrup-andel.dk
www.vejrup-andel.dk