

VINTERSÆD 2022-2023

— Stærkt sortiment af vintersæd



10 GODE GRUNDE

– til at vælge certificeret såsæd

- 1 CERTIFICERET SÅSÆD ER SORTSREN**
Sortsren såsæd medfører, at alle planter i marken er ensartede m.h.t. modning, stråstyrke, kvalitet o.s.v. Samtidig er der fuld sporbarhed ved salg til malt, brød m.v.
- 2 CERTIFICERET SÅSÆD ER ARTSREN**
Når der ikke er blandet fremmede kornarter i, kan avlen lettere afsættes til industri og eksport med øget sporbarhed, og foderværdien vil være mere ensartet.
- 3 CERTIFICERET SÅSÆD ER FRI FOR SYGDOMME**
Udsædsbårne sygdomme, der skader afgrøden, forebygges ved bejdsning med et anerkendt bejdsemiddel, bejdset i højteknologiske maskiner og med elektronisk overvågning af bejdsningen. Certificeret økologisk udsæd er dog ikke bejdset.
- 4 CERTIFICERET SÅSÆD HAR EN GARANTERET SPIREEVNE**
Høj spireevne giver sikkerhed for normale og kraftige planter samt ensartet fremspiring.
- 5 CERTIFICERET SÅSÆD ER RENSET FOR UKRUDTSFRØ**
Ukrudt påfører afgrøden konkurrence om vand og næringsstoffer, og forurener marken og evt. efterfølgende afgrøder (frøgræsudlæg).
- 6 CERTIFICERET SÅSÆD ER FRI FOR FLYVEHAVRE**
Certificeret såsæd er dyrket på marker, der ved markkontrol er fundet fri for flyvehavre.
- 7 CERTIFICERET SÅSÆD ER RENSET FOR SMÅ KERNER**
Store, ensartede kerner sikrer god og ensartet etablering af afgrøden, hvilket giver et sikkert og højere udbytte.
- 8 CERTIFICERET SÅSÆD GIVER STØRRE SIKKERHED**
Hvis uheldet er ude, og såsæden ikke lever op til kvalitetskravene, ydes der erstatningsudbetaling efter Landbrugsstyrelsens regler. Danmark er det eneste land i Europa med denne ordning.
- 9 MED CERTIFICERET SÅSÆD FØLGER RÅDGIVNING**
En stab af erfarne såsædsfolk står klar med gode råd om de enkelte sorters dyrknings- og kvalitetsegenskaber, så avleren kan få det bedst mulige økonomiske resultat ud af sit sortsvalg.
- 10 CERTIFICERET SÅSÆD OG FREMTIDEN**
Ved at vælge certificeret såsæd bidrager man til en fortsat udvikling af nye og endnu bedre sorter fra forædlerne via licensindtægterne, forædlerens eneste indtægtskilde.

Vigtigt at beregne den rigtige udsædsmængde – for hver dag, hvert parti og hvert såbed

SÅBEDSKVALITET	% FORVENTET MARKSPIRING		SÅDYBDE, CM		
	SEPTEMBER	BEGYNDELSEN AF OKTOBER	KORN		RAPS
			KONVENTIONELLE	HYBRIDER	LINIE OG HYBRIDER
GOD	90	85	4	2-3	1-2
MIDDEL	85	80			
DÅRLIG	80	75			

Forventet markspiring

Foruden såsædens angivne spiringsprocent er det vigtigt at vurdere såbedets karakter, når den forventede markspiringsprocent fastsættes. Selv med såsæd med høj spireevne og vitalitet har "Farmtest med etablering af vårsæd" vist helt ned til 60-70% af den ønskede plantebestand som følge af varierende sådybde, for høj såhastighed og dårligt såbed.

Ved optimal sådybde og såbed kan der regnes med ca. 90% markspiring, mens der ved mindre optimale forhold bør regnes med en lavere markspiring.

Markspiringsprocenten bør således fastsættes i intervallet 75-90% afhængig af såbedsforholdene.

Det er helt afgørende at indregne partiets TKV og de anbefalede plantetal på næste side i forhold til arter og såtidspunkter. De angivne retningsgivende plantetal er fastsat efter mange års landsforsøg og erfaringer. Den varierende faktor for beregning af den rette udsædsmængde, er fastsættelsen af vurderet fremspiringsprocent under de givne forhold. En forskel i forventet fremspiring på f.eks. 15% betyder en ændret udsædsmængde på 30 kg/ha.



Tusindkornsvægt (TKV) x ønsket plantetal (pl./m²)
 Forventet markspiringsprocent

= Kg udsæd pr. ha

ANBEFALEDE PLANTETAL PR. M² AFHÆNGIG AF SÅTIDSPUNKT

	AUGUST		SEPTEMBER						OKTOBER		
ART	10-24	25-31	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	1-3	4-7	8-11
HVEDE	-	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425
HVEDE, HYBRID	-	-	120	125	130	145	160	175	-	-	-
VINTERBYG, 2R	-	-	-	225	275	325	350	375	-	-	-
VINTERBYG, 6R	-	-	-	225	275	325	350	375	-	-	-
VINTERBYG, 6R HYBRID	-	-	125	145	165	185	225	-	-	-	-
RUG, HYBRID	-	-	140	150	160	170	190	200	200	200	-
TRITICALE	-	-	225	250	275	300	325	350	375	400	425
VINTERRAPS, LINIE**	40-50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VINTERRAPS, HYBRID**	30-35	35-40	40	-	-	-	-	-	-	-	-

*Plantetallet i vinterkorn øges med 25-50 pl./m² (mindst for hybrider) på kolde lokaliteter og/eller ved pløjefri dyrkning, dårligt såbed, høj risiko for snegleangreb og frøgræs som forfrugt.

**Plantetallet i vinterraps reduceres med 5 pl./m² ved etablering på rækker.

VINTERRAPS: ANBEFALEDE SÅVINDUER AFHÆNGIG AF SORTSVALG

AUGUST	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-31
LG AUCKLAND		x	x	x	x	(x)
ARTEMIS		(x)	x	x	x	x
PT 302		x	x	x	x	(x)
PT 303		x	x	x	x	(x)
DK EXPANSION		(x)	x	x	x	x
DK EXBURY	x	x	x	x	x	

VINTERBYG ANBEFALEDE SÅVINDUER AFHÆNGIG AF SORTSVALG

SEPTEMBER	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30
SY DAKOOTA	x	x	x	x		
SY GALILEO	x	x	x	x	x	
KWS MERIDIAN		(x)	x	x	x	
KWS WALLACE		(x)	x	x	x	
SENSATION		(x)	x	x	x	
LG GLOBETROTTER			x	x	x	
BORDEAUX			x	x	x	

VINTERRUG: ANBEFALEDE SÅVINDUER AFHÆNGIG AF SORTSVALG

SEPTEMBER	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30
ASTRANOS	x	x	x	x	x	(x)
KWS BERADO	x	x	x	x	x	(x)
KWS ROTOR	x	x	x	x	x	(x)

VINTERHVEDE: ANBEFALEDE SÅVINDUER AFHÆNGIG AF SORTSVALG

SEPTEMBER. OKTOBER.	1-5	6-10	11-20	21-25	26-30	1-10
PONDUS	x	x	x	x	x	
SORTSBLANDING (PONDUS, INFORMER, RGT SAKI)	x	x	x	x	x	
INFORMER		x	x	x	x	x
MOMENTUM			x	x	x	x
RGT SAKI	x	x	x	x	x	
CHEVIGNON			x	x	x	x
KWS LILI			x	x	x	

LG AUCKLAND

VINTERRAPS, HYBRID

FORÆDLER: LIMAGRAIN



LG Auckland hybrid

Sælges i sække med 1.500.000 frø.
Se specifikation på sækken.

Egenskaber:

- Meget højtydende sort
- Blandt de 4 højest ydende sorter i de sidste 2 års landsforsøg
- Besidder resistens mod rapsrødsot (TuYV)
- Besidder skulpeopspringsresistens
- Lav modtagelighed for lys bladplet
- Lav modtagelighed for phoma
- Lav modtagelighed for kransskimmel ifølge forædleren

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

OLIEINDHOLD

Lavt				Højt
------	--	--	--	------

PHOMA

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

PLANTEHØJDE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

STÆNGELSTYRKE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----


MODNINGSTID

Tidlig				Sen
--------	--	--	--	-----

ETABLERINGSTIDSPUNKT

1/8		10/8		20/8		31/8
-----	--	------	--	------	--	------

UDVIKLINGSSTADIER (St.)



VINTERRAPS: ANBEFALEDE SÅVINDUER AFHÆNGIG AF SORTSVALG

AUGUST	1-5	6-10	11-20	21-25	26-31
LG AUCKLAND		X	X	X	(X)
ARTEMIS		(X)	X	X	X
PT 302		X	X	X	(X)
PT 303		X	X	X	(X)
DK EXPANSION		(X)	X	X	X
DK EXBURY	X	X	X	X	

FAKTA

ÅR	FRØUDBYTTE* (fht)	FRØUDBYTTE** (fht)	OLIE INDHOLD* (%)	OLIE INDHOLD** (%)	AFGRØDEHØJDE VED HØST (cm)	LEJESÆD (kar. 0-10)
2021	110	-	50,4	-	152	1,7
2020	112	111	49,6	50,1	129	2,1
2019	-	111	-	50,5	-	-

*Landsforsøg. **Lovbestemt værdisafprøvning.

Kilde: Sortinfo.dk

PT 302

VINTERRAPS, HYBRID

FORÆDLER: PIONEER/CORTEVA



PT 302 hybrid

Sælges i units med 1.500.000 spiredygtige frø.
Se specifikation på sækken.

Egenskaber:

- Meget højtydende sort
- Besidder resistens mod rapsrødsot (TuYV)
- Lav modtagelighed for phoma
- Lav-middel modtagelighed for lys bladplet
- Højt olieindhold

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

OLIEINDHOLD

Lavt					Højt
------	--	--	--	--	------

PHOMA

Lav modtag.					Modtagelig
-------------	--	--	--	--	------------

PLANTEHØJDE

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

STÆNGELSTYRKE

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----


MODNINGSTID

Tidlig					Sen
--------	--	--	--	--	-----

ETABLERINGSTIDSPUNKT

1/8		10/8		20/8		31/8
-----	--	------	--	------	--	------

UDVIKLINGSSTADIER (St.)



VINTERRAPS: ANBEFALEDE SÅVINDUER AFHÆNGIG AF SORTSVALG

AUGUST	1-5	6-10	11-20	21-25	26-31
LG AUCLAND		X	X	X	(X)
ARTEMIS		(X)	X	X	X
PT 302		X	X	X	(X)
PT 303		X	X	X	(X)
DK EXPANSION		(X)	X	X	X
DK EXBURY	X	X	X	X	

FAKTA

ÅR	FRØUDBYTTE* (fht)	FRØUDBYTTE** (fht)	OLIE INDHOLD* (%)	OLIE INDHOLD** (%)	AFGRØDEHØJDE VED HØST (cm)	LEJESÆD (kar. 0-10)
2021	109	-	50,5	-	161	0,5
2020	104	102	50,4	50,8	122	2,2
2019	-	110	-	50,4	-	-

*Landsforsøg. **Lovbestemt værdiafprøvning.

Kilde: Sortinfo.dk

ARTEMIS

VINTERRAPS, HYBRID

FORÆDLER: LIMAGRAIN



Artemis hybrid

Sælges i sække med 1.500.000 frø.
Se specifikation på sækken.

Egenskaber:

- Stabilt ydende sort over flere år
- Besidder resistens mod rapsrødsot (TuYV)
- Besidder skulpeopspringsresistens
- Lav modtagelighed for phoma

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

OLIEINDHOLD

Lavt					Højt
------	--	--	--	--	------

PHOMA

Lav modtag.					Modtagelig
-------------	--	--	--	--	------------

PLANTEHØJDE

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

STÆNGELSTYRKE

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----


MODNINGSTID

Tidlig					Sen
--------	--	--	--	--	-----

ETABLERINGSTIDSPUNKT

1/8	10/8		20/8	31/8
-----	------	--	------	------

UDVIKLINGSSTADIER (St.)



VINTERRAPS: ANBEFALEDE SÅVINDUER AFHÆNGIG AF SORTSVALG

AUGUST	1-5	6-10	11-20	21-25	26-31
LG AUCLAND		X	X	X	(X)
ARTEMIS		(X)	X	X	X
PT 302		X	X	X	(X)
PT 303		X	X	X	(X)
DK EXPANSION		(X)	X	X	X
DK EXBURY	X	X	X	X	

FAKTA

ÅR	FRØUDBYTTE* (fht)	FRØUDBYTTE** (fht)	OLIE INDHOLD* (%)	OLIE INDHOLD** (%)	AFGRØDEHØJDE VED HØST (cm)	LEJES/ÆD (kar. 0-10)
2021	102	108	50,4	50,2	144	2,2
2020	103	108	49,4	47,9	135	1,8
2019	105	-	50,0	-	156	0,9

*Landsforsøg. ** Supplerende forsøg.

Kilde: Sortinfo.dk

DK EXPANSION

VINTERRAPS, HYBRID

FORÆDLER: DEKALB



DK Expansion hybrid

Sælges i sække med 1.500.000 frø.
Se specifikation på sækken.

Egenskaber:

- Velkendt og udbyttestabil sort
- Lav modtagelighed for phoma
- Besidder skulpeopspringsresistens

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

OLIEINDHOLD

Lavt					Højt
------	--	--	--	--	------

PHOMA

Lav modtag.					Modtagelig
-------------	--	--	--	--	------------

PLANTEHØJDE

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

STÆNGELSTYRKE

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----


MODNINGSTID

Tidlig					Sen
--------	--	--	--	--	-----

ETABLERINGSTIDSPUNKT

1/8	10/8		20/8	31/8
-----	------	--	------	------

UDVIKLINGSSTADIER (St.)



VINTERRAPS: ANBEFALEDE SÅVINDUER AFHÆNGIG AF SORTSVALG

AUGUST	1-5	6-10	11-20	21-25	26-31
LG AUCKLAND		X	X	X	(X)
ARTEMIS		(X)	X	X	X
PT 302		X	X	X	(X)
PT 303		X	X	X	(X)
DK EXPANSION		(X)	X	X	X
DK EXBURY	X	X	X	X	

FAKTA

ÅR	FRØUDBYTTE* (fht)	FRØUDBYTTE** (fht)	OLIE INDHOLD* (%)	OLIE INDHOLD** (%)	AFGRØDEHØJDE VED HØST (cm)	LEJESÆD (kar. 0-10)
2021	101	108	49,8	49,0	144	1,9
2020	106	104	49,5	47,8	130	1,7
2019	104	108	50,3	50,0	155	0,8

*Landsforsøg. **Lovbestemt værdiafprøvning.

Kilde: Sortinfo.dk

DK EXBURY

VINTERRAPS, HYBRID

FORÆDLER: DEKALB



DK Exbury hybrid

Sælges i units med 1.500.000 frø.
Se specifikation på sækken.

Egenskaber:

- Ny højtydende sort
- Egnet til tidlig såning pga. kompakt vækst
- Lav modtagelighed for phoma
- Besidder resistens mod rapsrødsot (TuYV)
- Besidder skulpeopspringsresistens

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

OLIEINDHOLD

Lavt					Højt
------	--	--	--	--	------

PHOMA

Lav modtag.					Modtagelig
-------------	--	--	--	--	------------

PLANTEHØJDE

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

STÆNGELSTYRKE

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----


MODNINGSTID

Tidlig					Sen
--------	--	--	--	--	-----

ETABLERINGSTIDSPUNKT

1/8	10/8		20/8	31/8
-----	------	--	------	------

UDVIKLINGSSTADIER (St.)



VINTERRAPS: ANBEFALEDE SÅVINDUER AFHÆNGIG AF SORTSVALG

AUGUST	1-5	6-10	11-20	21-25	26-31
LG AUCLAND		X	X	X	(X)
ARTEMIS		(X)	X	X	X
PT 302		X	X	X	(X)
PT 303		X	X	X	(X)
DK EXPAT	X	X	X	X	
DK EXBURY	X	X	X	X	

FAKTA

ÅR	FRØUDBYTTE* (fht)	FRØUDBYTTE** (fht)	OLIE INDHOLD* (%)	OLIE INDHOLD** (%)	AFGRØDEHØJDE VED HØST (cm)	LEJES/ÆD (kar. 0-10)
2021	105	-	50,1	-	160	0,7

*Landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk

PT 303

VINTERRAPS, HYBRID

FORÆDLER: PIONEER/CORTEVA



PT 303 hybrid

Sælges i units med 1.500.000 spiredygtige frø.
Se specifikation på sækken.

Egenskaber:

- Besidder tolerance mod knoldbægersvamp
- Besidder resistens mod rapsrødsot (TuYV)
- Lav modtagelighed for lys bladplet
- Lav modtagelighed for kransskimmel ifølge forædleren

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

OLIEINDHOLD

Lavt					Højt
------	--	--	--	--	------

PHOMA

Lav modtag.					Modtagelig
-------------	--	--	--	--	------------

PLANTEHØJDE

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

STÆNGELSTYRKE

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----


MODNINGSTID

Tidlig					Sen
--------	--	--	--	--	-----

ETABLERINGSTIDSPUNKT

1/8		10/8		20/8		31/8
-----	--	------	--	------	--	------

UDVIKLINGSSTADIER (St.)



VINTERRAPS: ANBEFALEDE SÅVINDUER AFHÆNGIG AF SORTSVALG

AUGUST	1-5	6-10	11-20	21-25	26-31
LG AUCLAND		X	X	X	(X)
ARTEMIS		(X)	X	X	X
PT 302		X	X	X	(X)
PT 303		X	X	X	(X)
DK EXPANSION		(X)	X	X	X
DK EXBURY	X	X	X	X	

FAKTA

ÅR	FRØUDBYTTE* (fht)	FRØUDBYTTE** (fht)	OLIE INDHOLD* (%)	OLIE INDHOLD** (%)	AFGRØDEHØJDE VED HØST (cm)	LEJESÆD (kar. 0-10)
2021	99	-	51,0	-	167	0,4
2020	112	109	50,3	50,6	140	1,3
2019	-	112	-	51,1	-	-

*Landsforsøg. **Lovbestemt værdiafprøvning.

Kilde: Sortinfo.dk

CREED

VINTERRAPS, HYBRID

FORÆDLER: NPZ



TOLERANCE MOD
KÅLBROK



Creed hybrid

Sælges i sække med 1.500.000 spiredygtige frø.
Se specifikation på sækken.

Egenskaber:

- Besidder stærk tolerance mod kålbrot
- Ny og bredere tolerance mod flere kålbrotcracer i form af "CR-resistens"
- Lav modtagelighed for phoma
- Obs. på lysbladplet i foråret


UDBYTTEPOTENTIALE



OLIEINDHOLD



PHOMA



PLANTEHØJDE



STÆNGELSTYRKE




MODNINGSTID



ETABLERINGSTIDSPUNKT



UDVIKLINGSSTADIER (St.)



FAKTA

ÅR	FRØUDBYTTE* (fht)	OLIE INDHOLD* (%)	AFGRØDEHØJDE VED HØST (cm)	LEJESÆD (kar. 0-10)
2021	101	50,2	155	0,3
2020	90	49,0	117	1,9
2019	-	-	-	0,9

*Landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk

OVERSIGT OVER DYRKNINGSFAKTORER SOM KAN FOREBYGGE OG REDUCERE KÅLBROK I JORDEN

Hold 5-6 frie år mellem raps i sædskiftet

Undlad gul sennep som efterafgrøde

Bekæmp spildplanter af raps i sædskiftet senest på deres 3-bladstadiet

Bekæmp øvrig korsblomstret ukrudt

Undgå fugtige pletter i marken / sammenkørt jord

Sikre rette / højt reaktions-/kalktal i forhold til jordtypen

Undgå meget tidlig såning af raps i august

Forebyg spredning af kålbrot med maskiner/redskaber - rengør mellem marker

Dyrk kun kålbrot-tolerante sorter i marker inficeret med kålbrot

CROME

VINTERRAPS, HYBRID

FORÆDLER: NPZ



TOLERANCE MOD
KÅLBROK



Crome hybrid

Sælges i units med 1.500.000 spiredygtige frø.
Se specifikation på sækken.

Egenskaber:

- Besidder god tolerance mod kålbrot
- Stabilt ydende og anerkendt sort
- Lav modtagelighed for phoma

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

OLIEINDHOLD

Lavt Højt

PHOMA

Lav modtag. Modtagelig

PLANTEHØJDE

Lav Høj

STÆNGELSTYRKE

Lav Høj


MODNINGSTID

Tidlig Sen

ETABLERINGSTIDSPUNKT

1/8 10/8 20/8 31/8

UDVIKLINGSSTADIER (St.)



FAKTA

ÅR	FRØUDBYTTE* (fht)	OLIE INDHOLD* (%)	AFGRØDEHØJDE VED HØST (cm)	LEJESÆD (kar. 0-10)
2021	98	51,4	144	0,3
2020	93	50,0	122	1,4
2019	99	50,8	141	0,7

*Landsforsøg. **Lovbestemt værdiafprøvning.

Kilde: Sortinfo.dk

OVERSIGT OVER DYRKNINGSFAKTORER SOM KAN FOREBYGGE OG REDUCERE KÅLBROK I JORDEN

Hold 5-6 frie år mellem raps i sædskiftet

Undlad gul sennep som efterafgrøde

Bekæmp spildplanter af raps i sædskiftet senest på deres 3-bladstadiet

Bekæmp øvrig korsblomstret ukrudt

Undgå fugtige pletter i marken / sammenkørt jord

Sikre rette / højt reaktions-/kalktal i forhold til jordtypen

Undgå meget tidlig såning af raps i august

Forebyg spredning af kålbrot med maskiner/redskaber – rengør mellem marker

Dyrk kun kålbrot-tolerante sorter i marker inficeret med kålbrot

PONDUS

VINTERHVEDE

FORÆDLER: **Nordic Seed**



RESISTENT MOD
HVEDEGALMYG



FODER



Egenskaber:

- Meget højtydende sort over flere år på alle jordtyper
- God, lav IPM-score
- Meget vinterfast
- Resistent mod hvedegalmug
- Meget lav modtagelighed for sygdomme
- Resistent mod alle kendte gulrustracer
- God stråstyrke
- Bredt såvindue - egner sig også til tidlig såning

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

GULRUST

Lav modtag.					Modtagelig
-------------	--	--	--	--	------------

SEPTORIA

Lav modtag.					Modtagelig
-------------	--	--	--	--	------------

MELDUG

Lav modtag.					Modtagelig
-------------	--	--	--	--	------------

BRUNRUST

Lav modtag.					Modtagelig
-------------	--	--	--	--	------------

STRÅSTYRKE

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

MODNINGSTID

Tidlig					Sen
--------	--	--	--	--	-----

ETABLERINGSTIDSPUNKT

1/9					10/10
-----	--	--	--	--	-------

BONUSINFO PONDUS

- Vinder i 2021 af højeste udbytte i forsøg i den engelske YEN-konkurrence
- Vinder i 2020 af højeste udbytte blandt alle deltagere udenfor England i YEN-konkurrencen
- Vinder i udbytte i 2020 i både de danske og svenske landsforsøg
- Blandt de højt ydende sorter i 2021 i både de danske og svenske landsforsøg
- Godkendt af Absolut Vodka i Sverige som stivelseshvede til destillering

PLANTEVÆRN

VÆKSTSTADIE	St. 12-15	St. 29-31	St. 32	St. 39	St. 53-65
SVAMPESYGDOMME		Hold øje med meldugangreb.	Hold øje med svampeangreb.	Anvend 0,5-0,7 ltr. Balaya.	Anvend 0,4 ltr. Propulse + 0,2 ltr. Orius Max. **
VÆKSTREGULERING*			0,3-0,4 ltr. Moddus M.		
SKADEDYR	Anvend 0,15 kg Lamdex / 0,1 ltr. Mavrik hvis behov for forebyggelse af havrerødsot.				Ved 25-50% angrebne strå af bladlus: anvend 0,15 kg Lamdex / 0,1 ltr. Mavrik.

*Vækstreguler aldrig stressede afgrøder. **Obs. på triazolregler.

FAKTA

						OBSERVATIONSPARCELLER				
ÅR	KERNE- UDBYTTE* (fht)	KERNE- UDBYTTE** (fht)	PROTEIN- UDBYTTE* (kg./ha)	PROTEIN- UDBYTTE** (kg./ha)	HEKTO- LITERVÆGT* (kg./hl)	MELDUG (%)	SEPTORIA (%)	GULRUST (%)	LEJESÆD (kar. 0-10)	IPM SCORE*** (kar 0-19)
2021	104	104	972	857	76,5	1,6	3,0	0,0	0,0	8
2020	107	-	1.023	-	77,2	4,3	4,6	0,0	0,0	8
2019	105	-	926	-	75,1	1,6	2,1	0,0	0,3	-

*Landsforsøg. **Supplerende landsforsøg. ***Forventet behandlingsbehov: kar. 0=lavt behov, kar. 19= højt behov.

Kilde: Sortinfo.dk

SORTSBLANDING

VINTERHVEDE, PONDUS - INFORMER - RGT SAKI

FORÆDLER: NORDIC SEED,
SAATZUCHT JOSEF BREUN, RAGT



Egenskaber:

- Højt ydende sortsblanding i hkg og protein
- En stærk "cocktail" til opfodring
- Sikrer en lav gennemsnitlig IPM score på 8
- God stråstyrke
- Bredt såvindue – egner sig også til tidlig såning

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

GULRUST

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

SEPTORIA

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

MELDUG

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

BRUNRUST

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

STRÅSTYRKE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----


MODNINGSTID

Tidlig				Sen
--------	--	--	--	-----

ETABLERINGSTIDSPUNKT

1/9				10/10
-----	--	--	--	-------

KORN UDVIKLINGSSTADIER (St.)



PLANTEVÆRN

VÆKSTSTADIE	St. 12-15	St. 29-31	St. 32	St. 39	St. 53-65
SVAMPESYGDOMME			Ved angreb af meldug, gulrust og septoria: Anvend 0,25 ltr. Prosaro.	Anvend 0,5-0,7 ltr. Balaya.	Anvend 0,4 ltr. Propulse + 0,2 ltr. Orius Max. **
VÆKSTREGULERING*			0,3 ltr. Moddus M.		
SKADEDYR	Anvend 0,15 kg Lamdex / 0,1 ltr. Mavrik hvis behov for forebyggelse af havrerødsot.				Ved 25-50% angrebne strå af bladlus: anvend 0,15 kg Lamdex / 0,1 ltr. Mavrik.

*Vækstreguler aldrig stressede afgrøder. **Obs. på triazolregler.

SORTSBLANDING

VINTERHVEDE, PONDUS - INFORMER - RGT BAIRSTOW

FORÆDLER: NORDIC SEED,
SAATZUCHT JOSEF BREUN, RAGT




Egenskaber:

- Højt ydende sortsblanding i hkg og protein
- En stærk "cocktail" til opfodring
- Sikrer en lav gennemsnitlig IPM score på 8
- Velegnet til medio-sen såning


UDBYTTEPOTENTIALE




GULRUST




SEPTORIA



MELDUG



BRUNRUST



STRÅSTYRKE




MODNINGSTID



ETABLERINGSTIDSPUNKT



KORN UDVIKLINGSSTADIER (St.)



PLANTEVÆRN

VÆKSTSTADIE	St. 12-15	St. 29-32	St. 32	St. 39	St. 53-65
SVAMPESYGDOMME			Hold øje med svampeangreb.	Anvend 0,5-0,7 ltr. Balaya.	Anvend 0,4 ltr. Propulse + 0,2 ltr. Orius Max. **
VÆKSTREGULERING*			0,3 ltr. Moddus M.		
SKADEDYR					Ved 25-50% angrebne strå af bladlus: anvend 0,15 kg Lamdex / 0,1 ltr. Mavrik.

*Vækstreguler aldrig stressede afgrøder. **Obs. på triazolregler.

SORTSBLANDING

VINTERHVEDE, PONDUS - INFORMER - MOMENTUM

FORÆDLER: NORDIC SEED,
SAATZUCHT JOSEF BREUN




Egenskaber:

- Højt ydende sortsblanding i hkg og protein
- En stærk "cocktail" til opfodring
- Sikrer en lav gennemsnitlig IPM score på 7
- Meget sund blanding og meget lav modtagelighed for gulrust
- Velegnet til medio-sen såning


UDBYTTEPOTENTIALE




GULRUST




SEPTORIA



MELDUG



BRUNRUST



STRÅSTYRKE




MODNINGSTID



ETABLERINGSTIDSPUNKT



KORN UDVIKLINGSSTADIER (St.)



PLANTEVÆRN

VÆKSTSTADIE	St. 12-15	St. 30-32	St. 33-37	St. 39	St. 53-65
SVAMPESYGDOMME			Hold øje med svampeangreb.	Anvend 0,5-0,7 ltr. Balaya.	Anvend 0,4 ltr. Propulse + 0,2 ltr. Orius Max. **
VÆKSTREGULERING*		0,4 ltr. Moddus M.			
SKADEDYR					Ved 25-50% angrebne strå af bladlus: anvend 0,15 kg Lamdex / 0,1 ltr. Mavrik.

*Vækstreguler aldrig stressede afgrøder. **Obs. på triazolregler.

INFORMER

VINTERHVEDE

FORÆDLER: SAATZUCHT JOSEF BREUN



Egenskaber:

- Stabilt ydende sort over flere år
- God, lav IPM-score
- Høj hektolitervægt
- Lav modtagelighed for sygdomme
- Langt men stærkt strå
- Optaget på brødhvede-listen til forhøjet N-kvot

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

GULRUST

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

SEPTORIA

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

MELDUG

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

BRUNRUST

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

STRÅSTYRKE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----


MODNINGSTID

Tidlig				Sen
--------	--	--	--	-----

ETABLERINGSTIDSPUNKT

1/9				10/10
-----	--	--	--	-------

KORN UDVIKLINGSSTADIER (St.)



PLANTEVÆRN

VÆKSTSTADIE	St. 12-15	St. 29-31	St. 32	St. 39	St. 53-65
SVAMPESYGDOMME		Hold øje med meldugangreb.	Ved angreb af meldug, gulrust og septoria: Anvend 0,25 ltr. Prosaro.	Anvend 0,5-0,7 ltr. Balaya.	Anvend 0,4 ltr. Propulse + 0,2 ltr. Orius Max. **
VÆKSTREGULERING*			0,3-0,4 ltr. Moddus M.		
SKADEDYR	Avend 0,15 kg Lamdex / 0,1 ltr. Mavrik hvis behov for forebyggelse af havrerødsot.				Ved 25-50% angrebne strå af bladlus: anvend 0,15 kg Lamdex / 0,1 ltr. Mavrik.

* Husk ingen vækstregulering i brødhvede og vækstreguler aldrig stressede afgrøder. **Obs. på triazolregler.

FAKTA

						OBSERVATIONSPARCELLER				
ÅR	KERNE-UDBYTTE* (fht)	KERNE-UDBYTTE** (fht)	PROTEIN-UDBYTTE* (kg./ha)	PROTEIN-UDBYTTE** (kg./ha)	HEKTO-LITERVÆGT* (kg./hl)	MELDUG (%)	SEPTORIA (%)	GULRUST (%)	LEJESÆD (kar. 0-10)	IPM SCORE*** (kar 0-19)
2021	99	98	932	834	77,2	0,2	4,9	0,0	0,0	8
2020	100	98	1.007	896	80,8	0,8	3,4	0,0	0,0	7
2019	104	103	970	913	76,8	2,1	3,2	0,0	0,7	-

*Landsforsøg. **Supplerende landsforsøg. ***Forventet behandlingsbehov: kar. 0=lavt behov, kar. 19= højt behov.

Kilde: Sortinfo.dk

RGT SAKI

VINTERHVEDE

FORÆDLER: RAGT



RESISTENT MOD
HVEDEGALMYG



FODER



Egenskaber:

- Stærk sort til meget tidlig såning
- Krybende vækst i efteråret
- Meget høj stråstyrke
- Resistent mod hvedegalmyg

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

GULRUST

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

SEPTORIA

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

MELDUG

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

BRUNRUST

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

STRÅSTYRKE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----


MODNINGSTID

Tidlig				Sen
--------	--	--	--	-----

ETABLERINGSTIDSPUNKT

1/9				10/10
-----	--	--	--	-------

KORN UDVIKLINGSSTADIER (St.)



PLANTEVÆRN

VÆKSTSTADIE	St. 12-15	St. 29-31	St. 32	St. 39	St. 53-65
SVAMPESYGDOMME			Ved angreb af meldug, gulrust og septoria: anvend 0,3 ltr. Prosaro.	Anvend 0,6-0,8 ltr. Balaya.	Anvend 0,4-0,5 ltr. Propulse + 0,2 ltr. Orius Max. **
VÆKSTREGULERING*			0,2-0,3 ltr. Moddus M.		
SKADEDYR	Anvend 0,15 kg Lamdex / 0,1 ltr. Mavrik hvis behov for forebyggelse af havre-rødsot.				Ved 25-50% angrebne strå af bladlus: anvend 0,15 kg Lamdex / 0,1 ltr. Mavrik.

*Vækstreguler aldrig stressede afgrøder. **Obs. på triazolregler.

FAKTA

						OBSERVATIONSPARCELLER				
ÅR	KERNE-UDBYTTE* (fht)	KERNE-UDBYTTE** (fht)	PROTEIN-UDBYTTE* (kg./ha)	PROTEIN-UDBYTTE** (kg./ha)	HEKTO-LITERVÆGT* (kg./hl)	MELDUG (%)	SEPTORIA (%)	GULRUST (%)	LEJESÆD (kar. 0-10)	IPM SCORE*** (kar 0-19)
2021	99	99	937	841	74,7	1,0	14,0	0,0	0,0	9
2020	105	-	1.018	-	77,9	2,4	11,0	0,0	0,0	8
2019	102	-	955	-	74,6	1,2	6,0	0,0	0,0	-

*Landsforsøg. **Supplerende landsforsøg. ***Forventet behandlingsbehov: kar. 0=lavt behov, kar. 19= højt behov.

Kilde: Sortinfo.dk

MOMENTUM

VINTERHVEDE

FORÆDLER: **Nordic Seed**



Egenskaber:

- Stærk sort til sen såning
- God, lav IPM-score
- Meget velegnet som 2. års hvede
- Meget lav modtagelighed for sygdomme
- Resistent mod alle kendte gulrustracer
- Hurtig vækststart efterår og forår

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

GULRUST

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

SEPTORIA

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

MELDUG

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

BRUNRUST

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

STRÅSTYRKE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----


MODNINGSTID

Tidlig				Sen
--------	--	--	--	-----

ETABLERINGSTIDSPUNKT

1/9				10/10
-----	--	--	--	-------

KORN UDVIKLINGSSTADIER (St.)



PLANTEVÆRN

VÆKSTSTADIE	St. 12-15	St. 30-32	St. 33-37	St. 39	St. 53-65
SVAMPESYGDOMME			Hold øje med svampeangreb.	Anvend 0,5-0,7 ltr. Balaya.	Anvend 0,4 ltr. Propulse + 0,2 ltr. Orius Max. **
VÆKSTREGULERING*		0,3-0,4 ltr. Moddus M.		Ved højt N-niveau og kraftige marker: suppler med 0,5 ltr. Medax Top + 1,0 ltr. Ammoniumsulfat.	
SKADEDYR					Ved 25-50% angrebne strå af bladlus: anvend 0,15 kg Lamdex / 0,1 ltr. Mavrik.

*Vækstreguler aldrig stressede afgrøder. **Obs. på triazolregler.

FAKTA

ÅR						OBSERVATIONSPARCELLER				IPM SCORE*** (kar 0-19)
	KERNE- UDBYTTE* (fht)	KERNE- UDBYTTE** (fht)	PROTEIN- UDBYTTE* (kg./ha)	PROTEIN- UDBYTTE** (kg./ha)	HEKTO- LITERVÆGT* (kg./hl)	MELDUG (%)	SEPTORIA (%)	GULRUST (%)	LEJESÆD (kar. 0-10)	
2021	95	100	886	849	74,9	0,2	10,0	0,0	0,0	8
2020	105	102	1.007	902	76,6	0,4	9,0	0,0	0,0	7
2019	103	-	921	-	74,2	0,3	3,3	0,0	1,8	-

*Landsforsøg. **Supplerende landsforsøg. ***Forventet behandlingsbehov: kar. 0=lavt behov, kar. 19= højt behov.

Kilde: Sortinfo.dk

CHEVIGNON

VINTERHVEDE

FORÆDLER: SAATEN-UNION



Egenskaber:

- Markedets tidligste sort til høst
- Velegnet som "forfrugt" til vinterraps og efterafgrøder
- Stabilt ydende sort på alle jordtyper
- Høj hektolitervægt
- Hurtig vækststart efterår og forår
- Egner sig til såning i det sene såvindue

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

GULRUST

Lav modtag.					Modtagelig
-------------	--	--	--	--	------------

SEPTORIA

Lav modtag.					Modtagelig
-------------	--	--	--	--	------------

MELDUG

Lav modtag.					Modtagelig
-------------	--	--	--	--	------------

BRUNRUST

Lav modtag.					Modtagelig
-------------	--	--	--	--	------------

STRÅSTYRKE

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----


MODNINGSTID

Tidlig					Sen
--------	--	--	--	--	-----

ETABLERINGSTIDSPUNKT

1/9					10/10
-----	--	--	--	--	-------

KORN UDVIKLINGSSTADIER (St.)



PLANTEVÆRN

VÆKSTSTADIE	St. 12-15	St. 30-32	St. 32	St. 39	St. 53-65
SVAMPESYGDOMME			Ved angreb af meldug, gulrust og septoria: anvend 0,3 ltr. Prosaro.	Anvend 0,6-0,8 ltr. Balaya.	Anvend 0,4-0,5 ltr. Propulse + 0,2 ltr. Orius Max. **
VÆKSTREGULERING*		0,3-0,4 ltr. Moddus M.		Ved højt N-niveau og kraftige marker: suppler med 0,5 ltr. Medax Top + 1,0 ltr. Ammoniumsulfat.	
SKADEDYR					Ved 25-50% angrebne strå af bladlus: anvend 0,15 kg Lamdex / 0,1 ltr. Mavrik.

*Vækstreguler aldrig stressede afgrøder. **Obs. på triazolregler.

FAKTA

						OBSERVATIONSPARCELLER				
ÅR	KERNE-UDBYTTE* (fht)	KERNE-UDBYTTE** (fht)	PROTEIN-UDBYTTE* (kg./ha)	PROTEIN-UDBYTTE** (kg./ha)	HEKTOLITERVÆGT* (kg./hl)	MELDUG (%)	SEPTORIA (%)	GULRUST (%)	LEJESÆD (kar. 0-10)	IPM SCORE*** (kar 0-19)
2021	96	98	914	838	77,4	3,1	24,0	0,0	0,0	11
2020	95	89	975	841	80,0	5,0	20,0	0,0	0,3	10
2019	100	-	955	-	76,5	2,2	8,0	0,0	0,7	-

*Landsforsøg. **Supplerende landsforsøg. ***Forventet behandlingsbehov: kar. 0=lavt behov, kar. 19= højt behov.

Kilde: Sortinfo.dk

RGT BAIRSTOW

VINTERHVEDE

FORÆDLER: RAGT



RESISTENT MOD
HVEDEGALMYG



FODER



Egenskaber:

- Højt ydende sort
- Resistent mod hvedegalmyg
- Moderat til kraftig vækst i efteråret
- Høj stråstyrke
- Lav modtagelighed for sygdomme

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

GULRUST

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

SEPTORIA

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

MELDUG

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

BRUNRUST

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

STRÅSTYRKE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----


MODNINGSTID

Tidlig				Sen
--------	--	--	--	-----

ETABLERINGSTIDSPUNKT

1/9				10/10
-----	--	--	--	-------

KORN UDVIKLINGSSTADIER (St.)



PLANTEVÆRN

VÆKSTSTADIE	St. 12-15	St. 29-31	St. 32	St. 39	St. 53-65
SVAMPESYGDOMME			Ved angreb af meldug, gulrust og septoria: anvend 0,3 ltr. Prosaro.	Anvend 0,5-0,7 ltr. Balaya.	Anvend 0,4 ltr. Propulse + 0,2 ltr. Orius Max. **
VÆKSTREGULERING*			0,2-0,3 ltr. Moddus M.		
SKADEDYR					Ved 25-50% angrebne strå af bladlus: anvend 0,15 kg Lamdex / 0,1 ltr. Mavrik.

*Vækstreguler aldrig stressede afgrøder. **Obs. på triazolregler.

FAKTA

ÅR						OBSERVATIONSPARCELLER				IPM SCORE*** (kar 0-19)
	KERNE- UDBYTTE* (fht)	KERNE- UDBYTTE** (fht)	PROTEIN- UDBYTTE* (kg./ha)	PROTEIN- UDBYTTE** (kg./ha)	HEKTO- LITERVÆGT* (kg./hl)	MELDUG (%)	SEPTORIA (%)	GULRUST (%)	LEJESÆD (kar. 0-10)	
2021	103	-	941	-	76,1	0,2	10,0	0,3	0,0	9
2020	107	109	1.006	1028	78,4	1,5	8,0	0,2	0,0	8
2019	-	108	-	965	76,4	1,8	4,3	0,2	0,2	-

*Landsforsøg. **Lovbestemt værdisafprøvning. ***Forventet behandlingsbehov: kar. 0=lavt behov, kar. 19= højt behov.

Kilde: Sortinfo.dk

KWS LILI

VINTERHVEDE

FORÆDLER: KWS



Egenskaber:

- Anerkendt brødhvede
- Stabilt udbytte
- Kort stift strå
- God kerne kvalitet og højt stabilt faldtal

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

GULRUST

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

SEPTORIA

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

MELDUG

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

BRUNRUST

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

STRÅSTYRKE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----


MODNINGSTID

Tidlig				Sen
--------	--	--	--	-----

ETABLERINGSTIDSPUNKT

1/9				10/10
-----	--	--	--	-------

KORN UDVIKLINGSSTADIER (St.)



PLANTEVÆRN

VÆKSTSTADIE	St. 12-15	St. 29-31	St. 32	St. 39	St. 53-65
SVAMPESYGDOMME			Ved angreb af meldug, gulrust og septoria: anvend 0,3 ltr. Prosaro.	Anvend 0,6-0,8 ltr. Balaya.	Anvend 0,4-0,5 ltr. Propulse + 0,2 ltr. Orius Max. **
VÆKSTREGULERING*					
SKADEDYR					Ved 25-50% angrebne strå af bladlus: anvend 0,15 kg Lamdex / 0,1 ltr. Mavrik.

*Vækstreguler aldrig brødhvede og stressede afgrøder. **Obs. på triazolregler.

FAKTA

ÅR						OBSERVATIONSPARCELLER				IPM SCORE*** (kar 0-19)
	KERNE- UDBYTTE* (fht)	KERNE- UDBYTTE** (fht)	PROTEIN- UDBYTTE* (kg./ha)	PROTEIN- UDBYTTE** (kg./ha)	HEKTO- LITERVÆGT* (kg./hl)	MELDUG (%)	SEPTORIA (%)	GULRUST (%)	LEJESÆD (kar. 0-10)	
2021	94	-	889	-	76,1	0,0	16,0	1,0	0,0	10
2020	99	96	957	857	79,5	0,1	13,0	0,5	0,0	8
2019	96	97	893	858	75,7	0,1	9,0	0,1	0,0	-

*Landsforsøg. **Supplerende landsforsøg. ***Forventet behandlingsbehov: kar. 0=lavt behov, kar. 19= højt behov.

Kilde: Sortinfo.dk

BORDEAUX

VINTERBYG, 2-RADET

FORÆDLER: **Nordic Seed**



Egenskaber:

- Stabilt ydende sort over flere år
- Dyrkningseget på alle jordtyper
- God vinterfasthed
- Middel stråstyrke
- Høj hektolitervægt

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

MELDUG

Lav modtag.					Modtagelig
-------------	--	--	--	--	------------

BYGRUST

Lav modtag.					Modtagelig
-------------	--	--	--	--	------------

SKOLDPLET

Lav modtag.					Modtagelig
-------------	--	--	--	--	------------


STRÅSTYRKE

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

ETABLERINGSTIDSPUNKT

1/9					25/9
-----	--	--	--	--	------

KORN UDVIKLINGSSTADIER (St.)



PLANTEVÆRN

VÆKSTSTADIE	St. 12-15	St. 32	St. 37-39	St. 39-45	St. 55 - 59
SVAMPESYGDOMME		Anvend 0,3 ltr. Prosaro hvis meldug, skoldplet og bygrust.		Anvend en bredspektret løsning som 0,4 ltr. Pro-pulse + 0,15 ltr. Comet Pro.	
VÆKSTREGULERING*		Anvend 0,2 ltr. Moddus M. ved højt N-niveau / kraftige marker.		0,2 ltr. Cerone.	
SKADEDYR					

*Vækstreguler aldrig stressede afgrøder.

FAKTA

ÅR				OBSERVATIONSPARCELLER					
	KERNE-UDBYTTE* (fht)	PROTEIN-UDBYTTE* (kg./ha)	HEKTO-LITERVÆGT* (kg./hl)	MELDUG (%)	BYGRUST (%)	SKOLDPLET (%)	RAMULARIA (%)	STRÅLÆNGDE (cm)	LEJESÆD (kar. 0-10)
2021	98	785	70,2	4,5	2,3	19,0	4,6	86,0	2,0
2020	100	830	69,6	10,0	7,0	18,0	-	73,0	0,0
2019	101	896	68,7	3,4	19,0	11,0	14,0	78,0	1,3

*Landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk

COMEBACK

VINTERBYG, 2-RADET

FORÆDLER: **Nordic Seed**



UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

MELDUG

Lav modtag. Modtagelig

BYGRUST

Lav modtag. Modtagelig

SKOLDPLET

Lav modtag. Modtagelig

STRÅSTYRKE

Lav Høj


ETABLERINGSTIDSPUNKT

1/9 25/9

Egenskaber:

- Stabilt udbyttepotentiale
- Dyrkningseget på alle jordtyper
- God stråstyrke
- Meget høj hektolitervægt
- Højt proteinindhold

KORN UDVIKLINGSSTADIER (St.)



PLANTEVÆRN

VÆKSTSTADIE	St. 12-15	St. 32	St. 37-39	St. 39-45	St. 55 - 59
SVAMPESYGDOMME		Anvend 0,25 ltr. Prosaro hvis meldug, skoldplet og bygrust.		Anvend en bredspektret løsning som 0,4 ltr. Pro-pulse + 0,15 ltr. Comet Pro.	
VÆKSTREGULERING*				0,2 ltr. Cerone.	
SKADEDYR					

*Vækstreguler aldrig stressede afgrøder.

FAKTA

ÅR	KERNE-UDBYTTE* (fht)	PROTEIN-UDBYTTE* (kg./ha)	HEKTO-LITERVÆGT* (kg./hl)	OBSERVATIONSPARCELLER					
				MELDUG (%)	BYGRUST (%)	SKOLDPLET (%)	RAMULARIA (%)	STRÅLÆNGDE (cm)	LEJESÆD (kar. 0-10)
2021	97	829	72,9	23,0	0,2	7,0	7,0	85,0	0,5
2020	97	850	71,6	15,0	2,3	11,0	-	75,0	0,0
2019	101	950	69,7	12,0	3,4	2,8	13,0	78,0	0,5

*Landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk

LG GLOBETROTTER

VINTERBYG

FORÆDLER: LIMAGRAIN



Egenskaber:

- Ny 2-radet sort med højt udbyttepotentiale
- Lav modtagelighed for sygdomme
- Middel stråstyrke
- Høj hektolitervægt
- Højt proteinindhold

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

MELDUG

Lav modtag. Modtagelig

BYGRUST

Lav modtag. Modtagelig

SKOLDPLET

Lav modtag. Modtagelig


STRÅSTYRKE

Lav Høj

ETABLERINGSTIDSPUNKT

1/9 25/9

KORN UDVIKLINGSSTADIER (St.)



PLANTEVÆRN

VÆKSTSTADIE	St. 12-15	St. 32	St. 37-39	St. 39-45	St. 55 - 59
SVAMPESYGDOMME		Anvend 0,2 ltr. Prosaro hvis meldug, skoldplet og bygrust.		Anvend en bredspektret løsning som 0,4 ltr. Pro-pulse + 0,15 ltr. Comet Pro.	
VÆKSTREGULERING*		Anvend 0,2 ltr. Moddus M. ved højt N-niveau / kraftige marker		0,2 ltr. Cerone.	
SKADEDYR					

*Vækstreguler aldrig stressede afgrøder.

FAKTA

ÅR				OBSERVATIONSPARCELLER					
	KERNE-UDBYTTE* (fht)	PROTEIN-UDBYTTE* (kg./ha)	HEKTO-LITERVÆGT* (kg./hl)	MELDUG (%)	BYGRUST (%)	SKOLDPLET (%)	RAMULARIA (%)	STRÅLÆNGDE (cm)	LEJESÆD (kar. 0-10)
2021	102	837	71,5	3,3	0,3	2,2	13,0	96,0	4,5
2020	103	879	69,7	6,0	2,8	4,7	-	84,0	0,0
2019	100	906	68,2	1,2	2,8	0,6	10,0	94,0	1,8

*Landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk

KWS MERIDIAN

VINTERBYG, 6-RADET

FORÆDLER: KWS



UDBYTTEPOTENTIALE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

MELDUG

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

BYGRUST

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

SKOLDPLET

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

STRÅSTYRKE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----


ETABLERINGSTIDSPUNKT

1/9				25/9
-----	--	--	--	------

Egenskaber:

- Velkendt og anerkendt 6-radet sort
- Stabilt ydende sort gennem mange år
- Velegnet på alle jordtyper
- God vinterfasthed
- Høj mangan tolerance

KORN UDVIKLINGSSTADIER (St.)



PLANTEVÆRN

VÆKSTSTADIE	St. 12-15	St. 32	St. 37-39	St. 39-45	St. 55 - 59
SVAMPESYGDOMME		Anvend 0,3 ltr. Prosaro hvis meldug, skoldplet og bygrust.		Anvend en bredspektret løsning som 0,5 ltr. Pro-pulse + 0,15 ltr. Comet Pro.	
VÆKSTREGULERING*		Anvend 0,2 ltr. Moddus M. ved højt N-niveau / kraftige marker.		0,2-0,3 ltr. Cerone.	
SKADEDYR	Anvend 0,15 kg Lamdex / 0,1 ltr. Mavrik hvis tidlig såning og risiko for angreb af bladlus og dermed havrerødsot.				

*Vækstreguler aldrig stressede afgrøder.

FAKTA

ÅR	KERNE- UDBYTTE* (fht)	PROTEIN- UDBYTTE* (kg./ha)	HEKTO- LITERVÆGT* (kg./hl)	OBSERVATIONSPARCELLER					
				MELDUG (%)	BYGRUST (%)	SKOLDPLET (%)	RAMULARIA (%)	STRÅLÆNGDE (cm)	LEJESÆD (kar. 0-10)
2021	100	860	66,1	2,5	21,0	3,7	6,0	99,0	4,5
2020	98	826	65,4	0,4	21,0	8,0	-	97,0	1,0
2019	103	986	64,0	0,2	14,0	4,0	11,0	97,0	0,5

*Landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk

**Egenskaber:**

- 6-radet sort med godt udbyttepotentiale
- God vinterfasthed
- God stråstyrke

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

MELDUG

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

BYGRUST

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

SKOLDPLET


Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

STRÅSTYRKE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

ETABLERINGSTIDSPUNKT

1/9				25/9
-----	--	--	--	------

KORN UDVIKLINGSSTADIER (St.)**PLANTEVÆRN**

VÆKSTSTADIE	St. 12-15	St. 32	St. 37-39	St. 39-45	St. 55 - 59
SVAMPESYGDOMME		Anvend 0,3 ltr. Prosaro hvis meldug, skoldplet og bygrust.		Anvend en bredspektret løsning som 0,5 ltr. Pro-pulse + 0,15 ltr. Comet Pro.	
VÆKSTREGULERING*		Anvend 0,2 ltr. Moddus M. ved højt N-niveau/ kraftige marker.		0,2-0,3 ltr. Cerone.	
SKADEDYR	Anvend 0,15 kg Lamdex / 0,1 ltr. Mavrik hvis tidlig såning og risiko for angreb af bladlus og dermed havrerødsot.				

*Vækstreguler aldrig stressede afgrøder.

FAKTA

				OBSERVATIONSPARCELLER					
ÅR	KERNE- UDBYTTE* (fht)	PROTEIN- UDBYTTE* (kg./ha)	HEKTO- LITERVÆGT (kg./hl)	MELDUG (%)	BYGRUST (%)	SKOLDPLET (%)	RAMULARIA (%)	STRÅLÆNGDE (cm)	LEJESÆD (kar. 0-10)
2021	100	831	66,8	5,0	14,0	7,0	4,8	102,0	0,5
2020	103	870	66,1	1,9	15,0	11,0	-	95,0	0,0

*Landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk

SENSATION

VINTERBYG, 6-RADET


FORÆDLER: DSV



RESISTENT MOD
HAVRERØDSOT



FODER



UDBYTTEPOTENTIALE



MELDUG



BYGRUST



SKOLDPLET



STRÅSTYRKE




ETABLERINGSTIDSPUNKT



Egenskaber:

- Resistent mod havrerødsot
- Udbyttepotentiale på niveau med kendte 6-radet sorter
- Tidlig modning
- God kerne kvalitet
- God stråstyrke

KORN UDVIKLINGSSTADIER (St.)



PLANTEVÆRN

VÆKSTSTADIE	St. 12-15	St. 32	St. 37-39	St. 39-45	St. 55 - 59
SVAMPESYGDOMME		Anvend 0,3 ltr. Prosaro hvis meldug, skoldplet og bygrust.		Anvend en bredspektret løsning som 0,5 ltr. Pro-pulse + 0,15 ltr. Comet Pro.	
VÆKSTREGULERING*		Anvend 0,2 ltr. Moddus M. ved højt N-niveau / kraftige marker.		0,2-0,3 ltr. Cerone.	
SKADEDYR					

*Vækstreguler aldrig stressede afgrøder.

SYGDOMS- OG UDBYTTEKARAKTERER*

UDBYTTE, UBEHANDLET (HKG/HA)	+++
UDBYTTE, BEHANDLET (HKG/HA)	++
MELDUG	+
BYGBLADPLET	+
RUST	+
BYGGULMOSAIK (TYPE 1 OG 2)	Resistent
HAVRERØDSOT (BYGGULDVÆRGSYGE)	Resistent

*) ++++ meget god; 0 medium.

Kilde: DSV

SY GALILEOO

VINTERBYG, 6-RADET HYBRID

FORÆDLER: SYNGENTA



Vinterbyg hybrider

Sælges i bigbags med 10 millioner kerner (10 units pr. bigbag)


Egenskaber:

- Højtydende hybrid gennem flere år
- Robust sort - kan etableres forholdsvis sent
- Lav modtagelighed for sygdomme
- Middel stråstyrke
- Højt proteinindhold


UDBYTTEPOTENTIALE




MELDUG



BYGRUST



SKOLDPLET




STRÅSTYRKE



ETABLERINGSTIDSPUNKT



KORN UDVIKLINGSSTADIER (St.)



PLANTEVÆRN

VÆKSTSTADIE	St. 12-15	St. 32	St. 37-39	St. 39-45	St. 55 - 59
SVAMPESYGDOMME		Anvend 0,2 ltr. Prosaro hvis meldug, skoldplet og bygrust.		Anvend en bredspektret løsning som 0,5 ltr. Pro-pulse + 0,15 ltr. Comet Pro.	
VÆKSTREGULERING*		Anvend 0,3 ltr. Moddus M. ved højt N-niveau / kraftige marker.		0,2-0,3 ltr. Cerone.	
SKADEDYR	Anvend 0,15 kg Lamdex / 0,1 ltr. Mavrik hvis tidlig såning og risiko for angreb af bladlus og dermed havrerødsot.				

*Vækstreguler aldrig stressede afgrøder.

FAKTA

				OBSERVATIONSPARCELLER					
ÅR	KERNE-UDBYTTE* (fht)	PROTEIN-UDBYTTE* (kg./ha)	HEKTO-LITERVÆGT (kg./hl)	MELDUG (%)	BYGRUST (%)	SKOLDPLET (%)	RAMULARIA (%)	STRÅLÆNGDE (cm)	LEJESÆD (kar. 0-10)
2021	101	843	66,1	0,4	3,2	7,0	4,2	111,0	2,0
2020	105	882	65,6	0,1	1,9	7,0	-	103,0	1,0
2019	108	1.017	65,9	0,0	6,0	4,7	3,7	101,0	1,3

*Landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk

SY DAKOOTA

VINTERBYG, 6-RADET HYBRID

FORÆDLER: SYNGENTA



Vinterbyg hybrider

Sælges i bigbags med 10 millioner kerner (10 units pr. bigbag)


Egenskaber:

- Ny højtydende hybrid
- Høj hektolitervægt
- God stråstyrke

UDBYTTEPOTENTIALE




MELDUG



BYGRUST



SKOLDPLET




STRÅSTYRKE



ETABLERINGSTIDSPUNKT



KORN UDVIKLINGSSTADIER (St.)



PLANTEVÆRN

VÆKSTSTADIE	St. 12-15	St. 32	St. 37-39	St. 39-45	St. 55 - 59
SVAMPESYGDOMME		Anvend 0,3 ltr. Prosaro hvis meldug, skoldplet og bygrust.		Anvend en bredspektret løsning som 0,5 ltr. Pro-pulse + 0,15 ltr. Comet Pro.	
VÆKSTREGULERING*		Anvend 0,3 ltr. Moddus M. hvis højt N-niveau / kraftige marker.		0,2-0,3 ltr. Cerone.	
SKADEDYR	Anvend 0,15 kg Lamdex / 0,1 ltr. Mavrik hvis tidlig såning og risiko for angreb af bladlus og dermed havrerødsot.				

*Vækstreguler aldrig stressede afgrøder.

FAKTA

				OBSERVATIONSPARCELLER					
ÅR	KERNE-UDBYTTE* (fht)	PROTEIN-UDBYTTE* (kg./ha)	HEKTO-LITERVÆGT (kg./hl)	MELDUG (%)	BYGRUST (%)	SKOLDPLET (%)	RAMULARIA (%)	STRÅLÆNGDE (cm)	LEJESÆD (kar. 0-10)
2021	104	867	67,2	1,0	19,0	0,7	10,0	102,0	1,0

*Landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk

ASTRANOS

VINTERRUG, HYBRID

FORÆDLER: **Nordic Seed**



Vinterrug hybrider

Sælges i bigbags med 12 millioner spiredygtige kerner (12 units pr. bigbag)


Egenskaber:

- Stabilt ydende hybrid
- Lav modtagelighed for meldrøjere
- Meget høj stråstyrke

UDBYTTEPOTENTIALE



MELDUG



BRUNRUST




SKOLDPLET



STRÅSTYRKE



KORN UDVIKLINGSSTADIER (St.)



PLANTEVÆRN

VÆKSTSTADIE	St. 29-31	St. 32	St. 37-45	St. 69
SVAMPESYGDOMME		Anvend 0,25 ltr. Prosaro hvis angreb af skoldplet og/eller brunrust.	Anvend 0,3 ltr. Prosaro + 0,15 ltr. Comet Pro.	Hold øje med angreb af brunrust.
VÆKSTREGULERING*		0,2-0,3 ltr. Moddus M.	Suppler med 0,2 ltr. Moddus M. + 0,2 ltr. Cerone ved højt N-niveau / kraftige marker.	
SKADEDYR			Anvend 0,15 kg Lamdex / 0,1 ltr. Mavrik ved mere end 0,5-1 trips pr. bladskede.	

*Husk ingen vækstregulering i brødrug og vækstreguler aldrig stressede afgrøder.

FAKTA

						OBSERVATIONSPARCELLER			
ÅR	KERNEUDBYTTE* (fht)	KERNEUDBYTTE** (fht)	PROTEINUDBYTTE* (kg./ha)	PROTEINUDBYTTE** (kg./ha)	FODERVÆRDI SVIN (kar. 1-9)	MELDUG (%)	BRUNRUST (%)	SKOLDPLET (%)	LEJESÆD (kar. 0-10)
2021	98	-	761	-	-	0,0	-	11,0	2,2
2020	100	-	836	-	-	-	0,2	11,0	0,5
2019	-	103	-	875	-	-	10,0	9,0	0,5

*Landsforsøg. **Lovbestemt værdiafprøvning.

KWS BERADO

VINTERRUG, HYBRID

FORÆDLER: KWS



Vinterrug hybrider

Sælges i bigbags med 12 millioner spiredygtige kerner (12 units pr. bigbag)


Egenskaber:

- Højtydende hybrid
- Lav modtagelighed for meldrøjere
- Høj stråstyrke
- Meget lav modtagelighed for brunrust


UDBYTTEPOTENTIALE



MELDUG



BRUNRUST




SKOLDPLET



STRÅSTYRKE



KORN UDVIKLINGSSTADIER (St.)



PLANTEVÆRN

VÆKSTSTADIE	St. 29-31	St. 32	St. 37-45	St. 69
SVAMPESYGDOMME		Anvend 0,25 ltr. Prosaro hvis angreb af skoldplet og/eller brunrust.	Anvend 0,3 ltr. Prosaro + 0,15 ltr. Comet Pro.	Hold øje med angreb af brunrust.
VÆKSTREGULERING*		0,3 ltr. Moddus M.	Suppler med 0,2 ltr. Moddus M. + 0,2 ltr. Cerone ved højt N-niveau / kraftige marker.	
SKADEDYR			Anvend 0,15 kg Lamdex / 0,1 ltr. Mavrik ved mere end 0,5-1 trips pr. bladskede.	

*Husk ingen vækstregulering i brødrug og vækstreguler aldrig stressede afgrøder.

FAKTA

						OBSERVATIONSPARCELLER			
ÅR	KERNEUDBYTTE* (fht)	KERNEUDBYTTE** (fht)	PROTEIN-UDBYTTE* (kg./ha)	PROTEIN-UDBYTTE** (kg./ha)	FODERVÆRDI, SVIN (kar. 1-9)	MELDUG (%)	BRUNRUST (%)	SKOLDPLET (%)	LEJESÆD (kar. 0-10)
2021	100	-	728	-	5	0,0	-	11,0	1,4
2020	104	-	792	-	5	-	0,1	10,0	1,5
2019	103	-	806	-	-	-	6,0	8,0	1,1

*Landsforsøg. **Supplerende landsforsøg.

KWS ROTOR

VINTERRUG, HYBRID

FORÆDLER: KWS



Vinterrug hybrider

Sælges i bigbags med 12 millioner spiredygtige kerner (12 units pr. bigbag).


Egenskaber:

- Ny og meget højt ydende hybrid
- Lav modtagelighed for meldrøjere

UDBYTTEPOTENTIALE



MELDUG



BRUNRUST




SKOLDPLET



STRÅSTYRKE



KORN UDVIKLINGSSTADIER (St.)



PLANTEVÆRN

VÆKSTSTADIE	St. 29-31	St. 32	St. 37-45	St. 69
SVAMPESYGDOMME		Anvend 0,25 ltr. Prosaro hvis angreb af skoldplet og/eller brunrust.	Anvend 0,3 ltr. Prosaro + 0,15 ltr. Comet Pro.	
VÆKSTREGULERING*		0,4 ltr. Moddus M.	Suppler med 0,2 ltr. Moddus M. + 0,2 ltr. Cerone ved højt N-niveau / kraftige marker.	
SKADEDYR			Anvend 0,15 kg Lamdex / 0,1 ltr. Mavrik ved mere end 0,5-1 trips pr. bladskede.	

*Husk ingen vækstregulering i brødrug og vækstreguler aldrig stressede afgrøder.

FAKTA

						OBSERVATIONSPARCELLER			
ÅR	KERNEUDBYTTE* (fht)	KERNEUDBYTTE** (fht)	PROTEIN-UDBYTTE* (kg./ha)	PROTEIN-UDBYTTE** (kg./ha)	FODERVÆRDI, SVIN (kar. 1-9)	MELDUG (%)	BRUNRUST (%)	SKOLDPLET (%)	LEJESÆD (kar. 0-10)
2021	103	-	704	-	5	0,0	-	10,0	2,9
2020	107	108	768	758	5	-	2,7	8,0	2,0
2019	-	105	-	839	-	-	14,0	7,0	0,9

* Landsforsøg ** Lovbestemt værdisafprøvning

BREHAT TRITICALE

FORÆDLER: FLORIMOND DESPREZ



Egenskaber:

- Udbyttestabil sort
- Godt alternativ til 2. års hvede
- Lav modtagelighed for svampe

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

GULRUST

Lav modtag.					Modtagelig
-------------	--	--	--	--	------------

SEPTORIA

Lav modtag.					Modtagelig
-------------	--	--	--	--	------------

MELDUG

Lav modtag.					Modtagelig
-------------	--	--	--	--	------------

STRÅSTYRKE

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----


MODNINGSTID

Tidlig					Sen
--------	--	--	--	--	-----

ETABLERINGSTIDSPUNKT

1/9					10/10
-----	--	--	--	--	-------

KORN UDVIKLINGSSTADIER (St.)



PLANTEVÆRN

VÆKSTSTADIE	St. 12-15	St. 29-31	St. 32	St. 39	St. 53-65
SVAMPESYGDOMME			Hold øje med meldug.	0,5 ltr. Propulse + 0,25 ltr. Orius Max	Hold øje med meldug og gulrust.
VÆKSTREGULERING*			0,3-0,4 ltr. Moddus M.		
SKADEDYR					Ved 25-50% angrebne strå af bladlus: anvend 0,15 kg Lamdex / 0,1 ltr. Mavrik.

*Vækstreguler aldrig stressede afgrøder.

FAKTA

				OBSERVATIONSPARCELLER				
ÅR	KERNEUDBYTTE* (fht)	PROTEIN- UDBYTTE* (kg./ha)	HEKTO- LITERVÆGT* (kg./hl)	MELDUG (%)	SEPTORIA (%)	GULRUST (%)	GULRUST, AKS	LEJESÆD (kar. 0-10)
2021	98	937	72,8	10,0	4,4	0,0	-	4,0
2020	99	-	73,1	6,0	2,6	0,0	-	3,3
2019	98	-	68,6	3,5	-	0,3	0,1	6,0

*Landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk



KONTAKT DIN NÆRMESTE GROVVAREFORRETNING FOR YDERLIGERE INFORMATION



NORDICSEED.DK/FORHANDLERE