

VÅRSÆD 2022

— Stærkt sortiment af vårsæd



KONTAKT DIN NÆRMESTE GROVVAREFORRETNING FOR YDERLIGERE INFORMATION



[NORDICSEED.DK/FORHANDLERE](https://nordicseed.dk/forhandlere)

10 GODE GRUNDE

– til at vælge certificeret såsæd

- 1

CERTIFICERET SÅSÆD ER SORTSREN
Sortsren såsæd medfører, at alle planter i marken er ensartede m.h.t. modning, stråstyrke, kvalitet o.s.v. Samtidig er der fuld sporbarhed ved salg til malt, brød m.v.
- 2

CERTIFICERET SÅSÆD ER ARTSREN
Når der ikke er blandet fremmede kornarter i, kan avlen lettere afsættes til industri og eksport med øget sporbarhed, og foderværdien vil være mere ensartet.
- 3

CERTIFICERET SÅSÆD HAR EN GARANTERET SPIREEVNE
Høj spireevne giver sikkerhed for normale og kraftige planter og ensartet fremspiring.
- 4

CERTIFICERET SÅSÆD ER RENSET FOR UKRUDTSFRØ
Ukrudt påfører afgrøden konkurrence om vand og næringsstoffer, samt forurener marken og evt. efterfølgende afgrøder (frøgræs).
- 5

CERTIFICERET SÅSÆD ER FRI FOR FLYVEHAVRE
Certificeret såsæd er dyrket på marker, der ved markkontrol er fundet fri for flyvehavre.
- 6

CERTIFICERET SÅSÆD ER RENSET FOR SMÅ KERNER
Store, ensartede kerner sikrer god og ensartet etablering af afgrøden, hvilket giver et sikkert og større udbytte.
- 7

CERTIFICERET SÅSÆD GIVER STØRRE SIKKERHED
Hvis uheldet er ude, og såsæden ikke lever op til kvalitetskravene, ydes der erstatningsudbetaling efter Landbrugsstyrelsens regler. Eneste land i Europa med denne ordning.
- 8

MED CERTIFICERET SÅSÆD FØLGER RÅDGIVNING
Erfarne såsædsfolk står klar med gode råd om de enkelte sorters dyrknings- og kvalitetsegenskaber, så avleren kan få det bedst mulige økonomiske resultat ud af sit sortsvalg.
- 9

CERTIFICERET SÅSÆD OG FREMTIDEN
Ved at vælge certificeret såsæd bidrager man til en fortsat udvikling af nye og endnu bedre sorter fra forædlerne via licensindtægterne, forædlerens eneste indtægtskilde.
- 10

OVERHOLDER VEJL. GRÆNSEVÆRDIER
Ved at vælge certificeret såsæd får man udsæd, der er undersøgt for svampesygdomme og overholder de vejledende grænseværdier for udsædsbårne sygdomme.

UDSÆDSMÆNGDER

ANBEFALEDE PLANTETAL OG SÅDYBDER I DE FORSKELLIGE VÅRSÆDSARTER			
ART	TKV INTERVAL	ANBEFALET PLANTETAL, PL/M² *	ANBEFALET SÅDYBDE, CM **
VÅRBYG, MALT	40-50	275-325	3-5
VÅRBYG, FODER	40-50	300-350	3-5
HAVRE, GRYN	40-50	350-400	4-5
HAVRE, FODER	40-50	300-400	4-5
VÅRHVEDE	45-55	425-475	3-5
HESTEBØNNER	300-600	45-55	8-10
MARKÆRT, RENBESTAND OG I BLANDING	250-350	80-90	6-8
LUPIN	150-200	100-125	3-4

*) Ved udlæg af græsfrø og kløvergræs i havre bør udsædsmængden reduceres med 10-15%. Ved højt ukrudtstryk anbefales højst angivne plantetal.

**) Dybest angivne sådybde anbefales, når/hvis der skal foretages mekanisk ukrudtsbekæmpelse.

UDSÆDSMÆNGDER (kg/ha) VED FORSKELLIG TUSINDKORNSVÆGT (TKV) OG PLANTETAL (pl/m²) VED 90% MARKSPIRING																						
TKV	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	225	250	300	350	450	500	550	600	650
Pl/m²																						
40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	111	133	156	200	222	244	267	289
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125	139	167	194	250	278	306	333	361
60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	167	200	233	300	333	367	40	433
70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175	194	233	272	350	389	428	467	506
200	84	89	93	98	102	107	111	116	120	124	129	133	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250	106	111	117	122	128	133	139	144	150	156	161	167	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-
275	116	122	128	134	141	147	153	159	165	171	177	183	189	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300	127	133	140	147	153	160	167	173	180	187	193	200	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-
325	137	144	152	159	166	173	181	188	195	202	209	217	224	-	-	-	-	-	-	-	-	-
350	148	156	163	171	179	187	194	202	210	218	226	233	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-
375	158	167	175	183	192	200	208	217	225	233	242	250	258	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400	169	178	187	196	204	213	222	231	240	249	258	267	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
425	179	189	198	208	217	227	236	246	255	264	274	283	293	-	-	-	-	-	-	-	-	-
450	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-
475	201	211	222	232	243	253	264	274	285	296	306	317	327	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) Tjek i god tid tusindkornsvægten (TKV) på udsæden i det pågældende parti. Den kan variere meget fra år til år, og i god tid før såning bør man sikre sig, at der er nok såsæd bestilt eller på lager.



Tusindkornsvægt x ønsket plantetal (pl./m²)
Forventet markspiringsprocent

= Kg udsæd pr. ha

Forventet markspiring
Foruden såsædens angivne spiringsprocent er det vigtigt at vurdere såbedets karakter, når den forventede markspiringsprocent fastsættes. Selv med såsæd med høj spireevne og vitalitet har ”Farmtest med etablering af vårsæd” vist helt ned til 60-70% af den ønskede plantebestand som følge af varierende sådybde, såhastighed og dårligt såbed.

Ved optimal sådybde og såbed kan der regnes med ca. 90% markspiring, mens der ved mindre optimale forhold bør regnes med en lavere markspiring.

Markspiringsprocenten bør således fastsættes i intervallet 75-90% afhængig af såbedsforholdene, og det har stor betydning for den optimale udsædsmængde, og det har stor betydning for den optimale udsædsmængde.



DOMINIK

HAVRE

FORÆDLER: SAATZUCHT B. BAUER GMBH



EGENSKABER

- Dobbelt nematoderesistent
- Anerkendt ældre sort
- Lav hektolitervægt
- Middel sygdomsmotagelighed
- God stråstyrke

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

RÅPROTEIN

Lav Høj

HEKTOLITERVÆGT

Lav Høj

BLADPLET

Lav modtag. Modtagelig

MELDUG

Lav modtag. Modtagelig

NEMATODER

Lav modtag. Modtagelig


STRÅSTYRKE

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

KORN UDVIKLINGSSTADIER (St.)



FAKTA

ÅR	UDBYTTEFORSØG					OBSERVATIONSPARCELLER	
	KERNEUDBYTTE	MERUDBYTTE FOR SVAMPEBEKÆMPELSE	RÅPROTEIN	HEKTO-LITERVÆGT	LEJESÆD	MELDUG	BLADPLET
	fht*		% ts*	kg/hl	karakter 0 - 10	% dækning	
2021	90	0,4	12,3	50,0	0,0	8,0	3,7
2020	97	7,6	11,1	55,8	0,3	38,0	3,7
2019	91	10,4	12,3	49,6	2,2	23,0	1,3
GNS 2019-2021	93	6,1	11,9	51,8	0,8	23,0	2,9

*Landsforsøg. Dominik har ikke indgået i de økologiske landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk

EVERGREEN

VÅRBYG

FORÆDLER: NORDIC SEED



EGENSKABER

- Anerkendt ældre sort
- Lav sygdomsmodtagelighed
- God hektolitervægt
- God stråstyrke
- Dobbelt nematoderesistent

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

HEKTOLITERVÆGT

Lav Høj

BYGRUST

Lav modtag. Modtagelig

BYGBLADPLET

Lav modtag. Modtagelig

SKOLDPLET

Lav modtag. Modtagelig

STRÅNEDKNÆKNING

Lav Høj

AKSNEDKNÆKNING

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

FAKTA (ØKOLOGISK AFPRØVNING)

ÅR	UDBYTTEFORSØG			OBSERVATIONSPARCELLER							
	KERNE- UDBYTTE	RÅPROTEIN	HEKTO- LITERVÆGT	LEJES/ÆD	AKSNED- KNÆKNING	STRÅNED- KNÆKNING	MELDUG	BYGRUST	SKOLDPLET	BLADPLET	RAMULARIA
	fht*	% ts*	kg/hl	Karakter 0 - 10			% dækning				
2021	101	10,2	68,3	0,0	0,3	3,0	0,0	0,0	1,8	0,0	3,0
2020	93	9,0	68,5	0,3	3,3	3,8	0,0	0,7	5,0	0,0	20,0
2019	107	9,7	66,8	1,2	1,5	5,5	0,0	6,0	0,9	0,0	15,0
GNS 2019- 2021	100	9,6	67,9	0,5	1,7	4,1	0,0	2,2	2,6	0,0	12,7

*Landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk



EGENSKABER

- Meget tidlig modning
- Velegnet til udlæg og før vinterraps
- Stabilt ydende sort over flere år
- Høj hektolitervægt
- Dobbelt nematoderesistent

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

HEKTOLITERVÆGT

Lav Høj

BYGRUST

Lav modtag. Modtagelig

BYGBLADPLET

Lav modtag. Modtagelig

SKOLDPLET

Lav modtag. Modtagelig

STRÅNEDKNÆKNING

Lav Høj

AKSNEDKNÆKNING

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

FAKTA (ØKOLOGISK AFPRØVNING)

ÅR	UDBYTTEFORSØG			OBSERVATIONSPARCELLER							
	KERNE- UDBYTTE	RÅPROTEIN	HEKTO- LITERVÆGT	LEJESÆD	AKSNED- KNÆKNING	STRÅNED- KNÆKNING	MELDUG	BYGRUST	SKOLDPLET	BLADPLET	RAMULARIA
	fht*	% ts*	kg/hl	Karakter 0 - 10			% dækning				
2021	101	10,2	67,0	0,0	1,3	1,5	0,0	14,0	2,7	0,0	23,0
2020	102	9,0	66,7	0,1	4,7	2,5	0,0	4,5	15,0	0,0	38,0
2019	103	10,0	64,2	0,0	4,0	7,0	0,0	7,0	0,9	0,1	18,0
GNS 2019- 2021	102	9,7	66,0	0,0	3,3	3,7	0,0	8,5	6,2	0,0	26,3

*Landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk

FAKTA (KONVENTIONEL AFPRØVNING)

	UDBYTTEFORSØG					OBSERVATIONSPARCELLER							
AR	KERNE- UDBYTTE	MERUDBYTTE FOR SVAMPE- BEKÆMPELSE	RÅ- PROTEIN	SORTERING AF KERNER OVER 2,5 MM	HEKTO- LITERVÆGT	LEJESÆD	AKSNED- KNÆKNING	STRÅNED- KNÆKNING	MELDUG	BYGRUST	SKOLDPLET	BLADPLET	RAMULARIA
	fht*		% ts*	%	kg/hl	Karakter 0 - 10			% dækning				
2021	101	5,7	10,6	96,0	68,3	0,0	1,3	1,5	0,0	14,0	2,7	0,0	23,0
2020	99	6,1	10,6	97,0	69,7	0,1	4,7	2,5	0,0	4,5	15,0	0,0	38,0
2019	99	8,2	11,9	94,0	67,5	0,0	4,0	7,0	0,0	7,0	0,9	0,1	18,0
GNS 2019- 2021	100	6,7	11,0	95,7	68,5	0,0	3,3	3,7	0,0	8,5	6,2	0,0	26,3

*Landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk

GREENWAY

MARKÆRT

FORÆDLER: NORDIC SEED



UDBYTTEPOTENTIALE



RÅPROTEIN



STÆNGELSTYRKE



AFGRØDEHØJDE VED HØST



MODNING



EGENSKABER

- Meget højtydende sort over flere år
- Halvbladløs med grønne frø
- Lav modtagelighed for ærteskimmel
- Lavt indhold af trypsininhibitorer

FAKTA (KONVENTIONEL AFPRØVNING)

ÅR	UDBYTTEFORSØG				
	KERNEUDBYTTE	RÅPROTEIN	TKV	AFGRØDEHØJDE VED HØST	LEJESÆD
	fht*	% ts*	g	cm	karakter 0 - 10
2021	109	23,7	281,0	65,0	1,3
2020	104	21,6	328,0	54,0	5,5
2019	106	22,6	282,0	55,0	6,3
GNS 2019-2021	106	22,6	297,0	58,0	4,4

*Landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk

INGRID MARKÆRT

FORÆDLER: LANTMÄNNEN SW SEED AB



UDBYTTEPOTENTIALE



RÅPROTEIN



STÆNGELSTYRKE



AFGRØDEHØJDE VED HØST



MODNING



EGENSKABER

- Stabilt ydende sort over flere år
- Halvbladløs med gule frø
- Høj afgrødehøjde ved høst
- Høj stængelstyrke

FAKTA (KONVENTIONEL AFPRØVNING)

ÅR	UDBYTTEFORSØG				
	KERNEUDBYTTE	RÅPROTEIN	TKV	AFGRØDEHØJDE VED HØST	LEJESÆD
	fht*	% ts*	g	cm	karakter 0 - 10
2021	103	23,9	272,0	70,0	0,0
2020	100	22,2	306,0	75,0	3,9
2019	103	22,6	288,0	56,0	5,8
GNS 2019-2021	102	22,9	288,7	67,0	3,2

*Landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk

JAVLO MARKÆRT

FORÆDLER: S.A. FLORIMOND DESPREZ



UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

RÅPROTEIN

Lav Høj

TKV

Lav Høj

STÆNGELSTYRKE

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

EGENSKABER

- Velafprøvet ældre sort til helsæd
- Høj foderværdi
- Højt proteinudbytte
- Sidst afprøvet i Landsforsøg 2007

Javlo markært har været på markedet i godt og vel 20 år. Sorten var i afprøvning i Landsforsøg 1999-2007, og har ligeledes været afprøvet i økologiske forsøg samt i Landsforsøg med ærtehelssæd i perioden 2000-2005. I 2019 blev der igen afprøvet sorter til helsæd, hvor Javlo var den højstydende.

Javlo har i hele afprøvningsperioden med ærtehelssæd ydet et højt stabilt udbytte, et højt proteinindhold samt en god afgrøde-højde ved høst.

DAISY



HESTEBØNNE

KVÆFODER

SVINEFODER

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

RÅPROTEIN

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

TANNIN INDHOLD

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

CHOKOLADEPLET

Lav				Modtagelig
-----	--	--	--	------------

BLADPLET

Lav				Modtagelig
-----	--	--	--	------------

VIKKESKIMMEL

Lav				Modtagelig
-----	--	--	--	------------

STÆNGELSTYRKE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

TKV


Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

MODNING

Tidlig				Sen
--------	--	--	--	-----

EGENSKABER

- Højt udbyttepotentiale
- Højt proteinindhold
- Høj stængelstyrke
- Blomst - broget, tanninholdig
- Tidlig til middeltidlig modning



KONVENTIONEL AFPRØVNING

FAKTA	UDBYTTEFORSØG				
	Kerneudbytte	Råprotein	TKV	Afgrødehøjde ved høst	Lejesæd
ÅR	fht	(%,ts)	(g)	cm	karakter 0-10
2020	105	30,1	612	135	1,1
2019	104	28,6	578	117	0,1
2018	111	27,0	570	83	0,0
GNS 2018-2020*	107	28,6	587	112	0,4

* Konventionelle landsforsøg. Der har ikke været udført økologisk afprøvning i hestebønner siden 2018.

Kilde: Sortinfo.dk

FORÆDLER: P. H. PETERSEN

HESTEBØNNE

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

RÅPROTEIN

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

TANNIN INDHOLD

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

CHOKOLADEPLET

Lav				Modtagelig
-----	--	--	--	------------

BLADPLET

Lav				Modtagelig
-----	--	--	--	------------

VIKKESKIMMEL

Lav				Modtagelig
-----	--	--	--	------------

STÆNGELSTYRKE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

TKV

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

MODNING

Tidlig				Sen
--------	--	--	--	-----

EGENSKABER

- Velkendt hestebønne med god udbyttestabilitet
- Blomst - broget, tanninholdig
- Høj TKV
- Høj stængelstyrke
- Middeltidlig modning



KONVENTIONEL AFPRØVNING

FAKTA	UDBYTTEFORSØG				
	Kerneudbytte	Råprotein	TKV	Afgrødehøjde ved høst	Lejesæd
ÅR	ght	(%,ts)	(g)	cm	karakter 0-10
2020	97	29,5	629	129	0,7
2019	101	27,5	633	114	0,1
2018	98	26,5	561	73	0,0
GNS 2018-2020*	99	27,8	608	105	0,3

* Konventionelle landsforsøg. Der har ikke været udført økologisk afprøvning i hestebønner siden 2018.

Kilde: Sortinfo.dk

FORÆDLER: NPZ

HESTEBØNNE

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

RÅPROTEIN

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

TANNIN INDHOLD

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

CHOKOLADEPLET

Lav				Modtagelig
-----	--	--	--	------------

BLADPLET

Lav				Modtagelig
-----	--	--	--	------------

VIKKESKIMMEL

Lav				Modtagelig
-----	--	--	--	------------

STÆNGELSTYRKE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

TKV

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

MODNING

Tidlig				Sen
--------	--	--	--	-----

EGENSKABER

- Høj udbyttestabilitet
- Blomst - broget, tanninholdig
- Lav modtagelighed for svampe
- Høj TKV
- Høj stængelstyrke
- Højt proteinindhold
- Sen modning



KONVENTIONEL AFPRØVNING

FAKTA	UDBYTTEFORSØG				
	Kerneudbytte	Råprotein	TKV	Afgrødehøjde ved høst	Lejesæd
ÅR	fht	(%,ts)	(g)	cm	karakter 0-10
2020	98	28,9	559	136	0,6
2019	107	27,5	601	122	0,0
2018	99	26,1	534	74	0,0
GNS 2018-2020*	101	27,5	565	111	0,2

* Konventionelle landsforsøg. Der har ikke været udført økologisk afprøvning i hestebønner siden 2018.

Kilde: Sortinfo.dk

FORÆDLER: NPZ

PRIMADONNA

SMALBLADET LUPIN

FORÆDLER: NORDIC SEED



UDBYTTEPOTENTIALE



PROTEIN




PLANTEHØJDE



STÆNGELSTYRKE



MODNING



EGENSKABER

- Stabilt udbytte over flere år
- Uforgrenet type med hvid frøskal
- Tidlig og meget ens modning
- Højt indhold af protein
- Sød lupin med lavt indhold af alkaloider

STAIRWAY

VÅRBYG

FORÆDLER: NORDIC SEED



NYHED -
MALKANDIDAT

FODER



EGENSKABER

- Meget højtydende sort over flere år
- God hektoliter vægt
- Lav sygdomsmodtagelighed
- Middel stråstyrke
- Dobbeltnematoderesistent

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

HEKTOLITERVÆGT

Lav Høj

BYGRUST

Lav modtag. Modtagelig

BYGBLADPLET

Lav modtag. Modtagelig

SKOLDPLET

Lav modtag. Modtagelig

STRÅNEDKNÆKNING

Lav Høj

AKSNEDKNÆKNING

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

FAKTA (ØKOLOGISK AFPRØVNING)

ÅR	UDBYTTEFORSØG			OBSERVATIONSPARCELLER							
	KERNE- UDBYTTE	RÅPROTEIN	HEKTO- LITERVÆGT	LEJESÆD	AKSNED- KNÆKNING	STRÅNED- KNÆKNING	MELDUG	BYGRUST	SKOLDPLET	BLADPLET	RAMULARIA
	fht*	% ts*	kg/hl	Karakter 0 - 10			% dækning				
2021	106	9,6	65,2	0,0	2,0	5,0	0,0	3,6	2,1	0,1	6,0

*Landsforsøg. Stairway har kun indgået i de økologiske landsforsøg i 2021.

Kilde: Sortinfo.dk

FAKTA (KONVENTIONEL AFPRØVNING)

	UDBYTTEFORSØG					OBSERVATIONSPARCELLER							
ÅR	KERNE- UDBYTTE	MERUDBYTTE FOR SVAMPE- BEKÆMPELSE	RÅ- PROTEIN	SORTERING AF KERNER OVER 2,5 MM	HEKTO- LITERVÆGT	LEJESÆD	AKSNED- KNÆKNING	STRÅNED- KNÆKNING	MELDUG	BYGRUST	SKOLDPLET	BLADPLET	RAMULARIA
	fht*		% ts*	%	kg/hl	Karakter 0 - 10			% dækning				
2021	102	6,8	10,3	94,0	68,0	0,0	2,0	5,0	0,0	3,6	2,1	0,1	6,0
2020	105	6,8	9,9	95,0	69,0	0,0	2,7	6,0	0,0	6,0	4,5	0,4	22,0
2019	102	9,1	11,6	90,0	66,4	0,8	3,0	4,5	0,0	4,5	0,8	0,1	14,0
GNS 2019- 2021	103	7,6	10,6	93,0	67,8	0,3	2,6	5,2	0,0	4,7	2,5	0,2	14,0

*Landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk

SYMPHONY

HAVRE

FORÆDLER: NORDSAT SAATZUCHTGESELLSCHAFT GMBH



EGENSKABER

- Stabilt ydende sort gennem flere år
- Kan anvendes til gryn - kontakt din nærmeste grovvareforretning
- Høj hektolitervægt - lille skalandel
- Middel sygdomsmodtagelighed
- God stråstyrke

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

RÅPROTEIN

Lav Høj

HEKTOLITERVÆGT

Lav Høj

BLADPLET

Lav modtag. Modtagelig

MELDUG

Lav modtag. Modtagelig

NEMATODER

Lav modtag. Modtagelig


STRÅSTYRKE

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

KORN UDVIKLINGSSTADIER (St.)



FAKTA (KONVENTIONEL AFPRØVNING)

ÅR	UDBYTTEFORSØG					OBSERVATIONSPARCELLER	
	KERNEUDBYTTE	MERUDBYTTE FOR SVAMPEBEKÆMPELSE	RÅPROTEIN	HEKTO-LITERVÆGT	LEJESÆD	MELDUG	BLADPLET
	fht*		% ts*	kg/hl	karakter 0 - 10	% dækning	
2021	100	2,6	11,8	51,1	0,0	7,0	8,0
2020	100	5,1	10,8	56,1	0,2	33,0	6,0
2019	99	9,8	12,1	50,6	2,0	20,0	1,8
GNS 2019-2021	100	5,8	11,6	52,6	0,7	20,0	5,3

*Landsforsøg. Symphony har ikke indgået i de økologiske landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk

THORUS

VÅRHVEDE

FORÆDLER: STRUBE RESEARCH GMBH & CO. KG



UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

RÅPROTEIN

Lav Høj

MELDUG

Lav modtag. Modtagelig

SEPTORIA

Lav modtag. Modtagelig

GULRUST

Lav modtag. Modtagelig

STRÅSTYRKE

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

EGENSKABER

- Højt udbytte over flere år
- Højt proteinindhold
- Kan anvendes som brødhvede - kontakt til grovvare
- Lav modtagelighed for gulrust og meldug
- Høj stråstyrke

FAKTA (KONVENTIONEL AFPRØVNING)

ÅR	UDBYTTEFORSØG*				OBSERVATIONSPARCELLER		
	KERNEUDBYTTE	RÅPROTEIN	HEKTOLITERVÆGT	LEJESÆD	MELDUG	SEPTORIA	GULRUST
	fht	% ts	kg/hl	Karakter 0 - 10	% dækning		
2021	100	12,5	67,5	1,0	0,0	7,0	0,0
2020	100	11,5	81,7	0,0	0,0	18,0	0,0
2019	100	12,9	78,6	0,0	2,3	7,0	0,2
GNS 2019-2021	100	12,3	75,9	0,3	0,8	10,7	0,1

*Landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk